

MARCELLO EMILIO POSI¹, DANILO SCUDERI²,
ANNA MARIA MIGLIETTA¹, GENUARIO BELMONTE¹

¹ Museo di Biologia Marina "Pietro Parenzan", DiSteBA,
Università del Salento, Via Vespucci, 73010 Porto Cesareo (LE)
marcello.posi@unisalento.it

² Dipartimento di Biologia Animale "Marcello La Greca",
Università di Catania, Via Androne, 95124 Catania

RIORDINO E AGGIORNAMENTO TASSONOMICO DELLA "COLLEZIONE DI MALACOLOGIA ECOLOGICA" DI PIETRO PARENZAN PRIMA PARTE

RIASSUNTO

Numerosi autori hanno recentemente posto in evidenza l'importanza dei musei relativamente alla ricerca nei settori della ecologia, biodiversità e conservazione della natura. Le collezioni museali rappresentano un vasto archivio di informazioni, relative ad intervalli di tempo particolarmente lunghi, utili ad implementare l'efficacia di indagini scientifiche attuali. Nella sua pluridecennale attività di ricerca, il Prof. Pietro Parenzan, fondatore dell'omonimo Museo di Biologia Marina, a Porto Cesareo, mediante dragaggi effettuati soprattutto lungo le coste pugliesi ed attraverso attività di scambio di reperti con quelli di altri noti collezionisti, ha costituito una collezione malacologica che contava 1556 specie e varietà di molluschi marini, rappresentati da migliaia di esemplari. Il presente lavoro rappresenta un primo contributo per la restituzione alla comunità scientifica, ed alla collettività, del patrimonio storico e documentario rappresentato dalla "Collezione di Malacologia Ecologica" del Prof. P. Parenzan. Tale finalità è stata perseguita attraverso attività di riordino, documentazione fotografica e rinnovamento della conservazione dei reperti, nonché attraverso la realizzazione di un catalogo informatico ed un primo aggiornamento della collocazione tassonomica dei reperti, limitatamente a 1241 lotti di materiale malacologico monosppecifico (su un totale di 6794).

SUMMARY

Many authors have recently evidenced the importance of museums relatively to the research in the fields of the ecology, biodiversity and nature conservation. Collections represent vast archives of information useful to implement the effectiveness of scientific surveys. In many decades of research activities, Prof. Pietro Parenzan, who founded the Marine Biology Museum in Porto Cesareo, has constituted a shell collection of 1556 species represented by thousands of specimens. The Collection was realized dredging sea bottoms along the coasts of Apulia and through specimens exchange activities with other famous malacologists. The present work represents a first contribution to the restitution of the historical and documentary heritage named "Ecological Malacology Collection" by the Prof. P. Parenzan to the scientific community. Such a purpose has been pursued through photographic documentation, ordering and conservation renewal activities, but also through the realization of a digital catalogue and by a modernization of the taxonomical positioning of specimens which, by now, is limited to 1241 mono specific shell groups (on a total of 6794).

INTRODUZIONE

Uno dei più importanti argomenti a sostegno della utilità dei musei di storia naturale afferma che questi, considerati nella loro totalità, rappresentano una risorsa unica di informazioni sulla ricchezza in specie (biodiversità), sia su scala storica che attuale (KRISHTALKA and HUMPHREY, 2000; SUAREZ and TSUTSUI, 2004).

Il valore delle collezioni dei musei naturalistici, per ciò che concerne la ricerca nei settori della ecologia e della biodiversità, è stato recentemente posto in evidenza da numerosi autori (si veda, ad esempio: HOAGLAND, 1989; HAWKSWORTH and MOUND, 1991; NIELSEN and WEST, 1994; DAVIS, 1996). Le collezioni rappresentano un vasto archivio di informazioni, relative ad intervalli di tempo particolarmente lunghi, che possono risultare utili ad implementare l'efficacia di indagini scientifiche attuali, fornendo dati relativi ad un orizzonte temporale più ampio (PONDER *et al.*, 2001). Tale potenzialità risulta particolarmente efficace in attività di ricerca riguardanti gli organismi invertebrati. Questi, infatti, pur rappresentando la maggior parte delle forme di vita animale, sono stati spesso ignorati all'interno dei programmi di conservazione e gestione della natura, e sebbene la necessità di porre attenzione agli invertebrati, nella redazione di tali programmi, abbia ricevuto una maggiore considerazione negli ultimi anni (DISNEY, 1986; MAJER, 1987; HEYWOOD, 1995; PONDER and LUNNEY, 1999), tale aspetto risulta ancora sottostimato a

causa della ridotta quantità di dati pubblicati, ma anche del tempo e dei costi relativi allo sviluppo di piani di campionamento su larga scala geografica, nonché della necessità di coinvolgere nel gruppo di lavoro un elevato numero di tassonomi specialisti.

I dati storici custoditi dalle collezioni museali, soprattutto se includono informazioni utili, come la precisa indicazione dell'area geografica di reperimento degli esemplari, possono fornire linee guida attraverso le quali comprendere e quantificare le conseguenze ecologiche dell'impatto di attività antropiche in area costiera, su ampia scala temporale (JACKSON and SALA, 2001; ROY *et al.*, 2003).

I dati provenienti dalle collezioni museali sono stati di recente utili in lavori di mappatura della distribuzione delle specie e determinazione di aree geografiche meritevoli di vincoli di tutela (PRENDERGAST *et al.*, 1993; VÄISÄNEN and HELIÖVAARA, 1994; DRINKROW and CHERRY, 1995; SKELTON *et al.*, 1995; WILIAMS *et al.*, 1996; KRESS *et al.*, 1998; MCCARTHY, 1998).

Nella sua pluridecennale attività di raccolta, il Prof. Pietro Parenzan, fondatore dell'omonimo Museo di Biologia Marina a Porto Cesareo (LE), mediante dragaggi effettuati soprattutto lungo le coste pugliesi ed attraverso attività di scambio di reperti con quelli di altri noti collezionisti, ha messo insieme una collezione malacologica di 1556 specie e varietà di molluschi marini, rappresentati da migliaia di esemplari (FANELLI *et al.*, 2002).

La Collezione, per l'imponente mole di reperti che comprendeva, permise al Prof. P. Parenzan di acquisire informazioni relative alla totalità della fauna malacologica del Mar Mediterraneo, in seguito raccolte nella pubblicazione dal titolo *Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo* (PARENZAN, 1970; 1974a; 1976a; b) che, unica guida completa alla identificazione delle specie, si collocò in un momento di stasi degli studi malacologici in Italia e tutt'ora è consultata dagli studiosi del settore. Pietro Parenzan catalogò il materiale malacologico raccolto in 3 dattiloscritti, realizzando il primo di questi nel 1974, il secondo nel 1977, il terzo nel 1985 (PARENZAN 1974b, 1977, 1985). Ciascuno di tali documenti comprendeva una breve prefazione consistente nella descrizione delle peculiarità dell'elenco di specie che seguiva e delle attività di ricerca degli esemplari svolte dal collezionista. Nei primi 2 volumi Parenzan conferisce all'insieme dei reperti malacologici la denominazione: *Collezione di Malacologia Ecologica*, in riferimento alle modalità costitutive della raccolta, che non prevedevano alcun restauro né pulizia degli esemplari (ottenuti attraverso la diretta attività di ricerca del professore), i quali potevano essere stati raccolti sia quando erano ancora vivi che in qualità di individui spiaggiati, integri o già danneggiati.

I volumi in questione, che non furono mai pubblicati, risultano caratterizzati da numerosi refusi di stampa ed errori di catalogazione che, commessi durante la stesura di un volume, venivano a volte corretti durante la battitura

di quelli seguenti. I cataloghi contengono la denominazione scientifica alla quale erano riferibili i lotti di reperti, l'autore della specie (anche se questo non è sempre indicato) e numerose note del collezionista (e/o di suoi collaboratori) riguardanti le caratteristiche e la provenienza dei singoli esemplari.

È chiaro che il Parenzan, nel costituire la propria collezione, non fu tanto interessato ad ottenere esemplari che potessero essere esposti nel proprio museo, quanto a costituire un vero e proprio archivio della fauna malacologica mediterranea (e mondiale) che potesse essere consultato da ricercatori di qualunque nazionalità (FANELLI *et al.*, 2002).

I reperti erano contenuti, singolarmente o in gruppi generalmente monospecifici (ossia riferibili ad una singola specie), all'interno di contenitori di differente tipologia (buste e capsule in materiale plastico, provette in vetro, tubicini in gomma). Ciascun contenitore era generalmente corredato di un cartellino che nella maggior parte dei casi era compilato, in maniera autografa, dal Professor Parenzan, nel resto dei casi era compilato da altri studiosi a cui egli aveva affidato il compito della determinazione. I lotti di reperti (sia quelli costituiti da una sola conchiglia che quelli comprendenti più esemplari) erano stati stipati alla rinfusa nei cassetti e sugli scaffali di alcuni mobili metallici, oppure raccolti in scatole (adattate allo scopo, come i contenitori per camicie), presso due vani, adibiti a deposito, all'interno del Museo di Biologia Marina di Porto Cesareo e della sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento (fig. 1).



Fig. 1: conservazione storica del materiale.

Negli anni che hanno seguito la scomparsa del collezionista e preceduto l'inizio del presente lavoro, i lotti costituenti la Collezione sono stati nella maggior parte dei casi trascurati e lasciati in condizioni di abbandono. Talvolta, tuttavia, questi sono stati interessati da tentativi di riordino condotti secondo criteri non appropriati, che hanno comportato la dispersione di alcuni reperti o dei cartellini.

La Collezione, quindi, all'inizio del lavoro in oggetto si presentava in condizioni tali da non risultare possibile neppure stimare quanto di ciò che il Parenzan aveva raccolto fosse ancora rinvenibile.

Il presente lavoro rappresenta un primo contributo per la restituzione alla comunità scientifica ed alla collettività del patrimonio storico e documentario rappresentato dalla *Collezione di Malacologia Ecologica* del Prof. Pietro Parenzan.

A tal fine si è provveduto a studiare e rendere in formato digitale i tre cataloghi storici, analizzare in maniera approfondita il materiale malacologico disponibile, valutare l'entità dei danni riportati dalla Collezione nel corso degli anni, ripristinare l'integrità dei contenitori delle conchiglie o rinnovare completamente la conservazione degli stessi secondo i moderni canoni della corretta conservazione, offrire una testimonianza fotografica digitale di una porzione dei lotti di reperti disponibili che fosse rappresentativa della Collezione. Il materiale malacologico selezionato in funzione del piano sperimentale è stato, in seguito, riordinato per una immediata fruibilità dei lotti da parte degli studiosi del settore, anche attraverso la realizzazione di un archivio informatico (unico) dei dati disponibili. Al completamento di queste attività è stato condotto un primo aggiornamento della collocazione tassonomica dei reperti, limitatamente a 1241 lotti (18%) di materiale malacologico monospecifico, su un totale di 6794 lotti.

MATERIALI E METODI

Per assicurare la permanenza di una testimonianza storica della produzione da parte del collezionista dei tre volumi di cui si compone il Catalogo storico (dattiloscritto) della Collezione (PARENZAN, 1974b; 1977; 1985) si è deciso di acquisire le singole pagine come file di immagine (attraverso l'uso di uno scanner HP PSC 1510s) e, in seguito, di riunirle e convertirle in 3 documenti per *Acrobat Reader* corrispondenti, ciascuno, ad uno degli originari cataloghi.

La nuova catalogazione del materiale malacologico si è svolta a partire dai dati disponibili nei Cataloghi Storici, che sono stati trascritti all'interno di un foglio di lavoro per *Microsoft Excel*. Tale formato digitale di raccolta dei dati appariva utile al riordino delle informazioni che si rendevano disponi-

bili attraverso lo studio dei cataloghi e l'esame diretto dei lotti costituenti la Collezione nonché funzionale al loro completamento con l'introduzione di eventuali note del revisore. Tale strumento informatico permetterà, peraltro, una ricerca veloce ed automatica dei dati (disposti in colonne), attraverso l'imposizione di alcune *query*. È stato così prodotto un foglio di lavoro le cui righe corrispondono ciascuna ad un lotto di reperti segnalato da Pietro Parenzan.

I dati del *file Excel* sono stati organizzati in alcune colonne, delle quali una è relativa al Genere (o *Taxon* superiore), una alla specie, una all'autore della specie, alla sottospecie (o variante) ed all'autore della sottospecie, una alle note del collezionista, l'ultima al numero progressivo identificativo del catalogo storico dattiloscritto (PARENZAN, 1974b; 1977; 1985) da cui il record è stato tratto. Si è scelto pertanto di assegnare il numero "1" al catalogo battuto per primo, il numero "2" al secondo ed il "3" al terzo. I record del file di catalogo sono stati ordinati alfabeticamente rispetto al Genere, ed in seguito rispetto alla specie ed alla variante, o sottospecie, qualora queste fossero menzionate.

Non tutti i campi descritti e costituenti il foglio di lavoro hanno ospitato dati perché i cataloghi storici non presentavano informazioni complete per tutti i lotti segnalati.

Successivamente si è provveduto ad assegnare ad ogni *record* del *file* di catalogo un codice identificativo di lotto, definito "n. SBM" (numero della Stazione di Biologia Marina), che ha permesso di conferire un maggiore ordine ai reperti della collezione, riunendo sotto una comune indicazione lotti differenti ma relativi alla stessa specie, nonché di ovviare a sinonimie delle specie ed errori nella battitura commessi dal Parenzan. Questo dato è andato a costituire la prima colonna del *database*. Attraverso l'imposizione del codice di lotto (n. SBM), l'ordine dei *record* nel catalogo informatico è, quindi, diventato in primo luogo alfabetico e poi tassonomico.

Seguono le regole per l'assegnazione del codice (n. SBM):

1) Il codice consiste in un numero decimale.

2) La parte del codice che compare prima della virgola (parte intera) indica la specie (o un *Taxon* ad essa superiore, quando la determinazione storica non si spinge sino al rango di specie), mentre le cifre decimali indicano il lotto. Così, ad esempio: 1,00 è il primo lotto della specie *Abra alba*; 1,01 è il secondo lotto della stessa specie; 2,00 è il primo lotto della specie *Abra longicallus*.

3) Specie indeterminate (indicate con "sp." oppure "spp.") appartenenti allo stesso genere hanno parte intera del codice di valore differente. Ad esempio: *Aclis* sp. è indicata col numero 26,00 mentre il seguente *Aclis* sp. è indicato con 27,00. È verosimile che l'autore, essendo certo del Genere

di appartenenza di più lotti, indicasse con "sp." ed "spp." specie diverse per le quali non era riuscito a giungere ad una determinazione più precisa. Nei cataloghi storici, infatti, non vi sono indicazioni quali, ad esempio: sp. 1, sp.2, sp.3, che facciano immaginare che P. Parenzan volesse indicare lotti differenti di una stessa specie a lui non nota (ad es.: sp. 1, sp.2, sp.3) ma riconducibile ad uno stesso Genere.

4) Lotti di specie contrassegnati da un punto interrogativo ("?") hanno parte intera del codice differente da quella della specie a cui, con una certa indecisione, sono riferibili, così "*Alvania geryonia*" è 61,00 mentre "*Alvania geryonia?*" è 62,00. Quest'ultimo lotto, infatti, potrebbe non contenere esemplari di "*Alvania geryonia*", essendo la determinazione del collezionista incerta.

5) Lotti recanti nomi che sembrerebbero indicare specie differenti, ma che sono riconducibili facilmente ad una stessa specie, perché rappresentano chiari errori di battitura, oppure scientificamente riconosciuti come sinonimi, vengono contrassegnati con la stessa porzione intera del numero di codice. Così, ad esempio: *Amiantis purpurata* ed *Amiantis purpurea*, ambedue descritte da Lamarck, sono ora accomunate dalla stessa parte intera del codice identificativo e, nella fattispecie, sono indicate con n. SBM: 83,00 ed 83,01. Allo stesso modo *Trunculariopsis trunculus* e *Murex trunculus* sono individuati dalla stessa porzione intera del codice (il numero 984).

I lotti di materiale malacologico disponibili sono stati vagliati integralmente e selezionati con la finalità di reperire almeno un lotto per ciascuna delle specie segnalate dai cataloghi storici per le quali Pietro Parenzan aveva dato una determinazione tassonomica certa. Il disegno sperimentale ha previsto, quindi, la costituzione di una collezione rappresentativa di quella originaria che tralasciasse solo eventuali differenze riscontrabili a livello di sottospecie tra i lotti ed i reperti riferibili a gruppi tassonomici di determinazione non chiara per il collezionista. Una volta selezionati i lotti si è passati al reperimento di reperti con caratteristiche particolari (ad es.: lotti di opercoli e reperti di differenti dimensioni ed età) ma riconducibili a specie già considerate.

I lotti isolati sono stati oggetto di attività di ripristino della integrità dei contenitori originali oppure sostituzione degli stessi con nuovi contenitori in materiale plastico (rigido o flessibile), adatti ad una migliore conservazione (si veda SCUDERI, 2007). I cartellini che accompagnavano i reperti sono stati conservati in buste di dimensioni adeguate ed introdotti nel contenitore del lotto corrispondente. Quando le dimensioni del reperto lo hanno consentito, il cartellino ed il reperto, singolarmente conservati, sono stati a loro volta posti in un contenitore plastico di maggiori dimensioni che li raccoglieva entrambi.

In alcuni casi si è provveduto a conservare anche i contenitori originali

dei reperti (o parte di essi) per garantire una testimonianza dei principali metodi originari di conservazione e delle note del collezionista, o del determinatore, quando risultavano impresse sugli stessi. In questo caso un contenitore nuovo, di maggiori dimensioni, raccoglieva al suo interno il materiale malacologico ed il cartellino originale (entrambi singolarmente conservati), nonché il contenitore originario o parte di esso (se consistente in una bustina recante delle annotazioni).

Sul contenitore esterno di ogni lotto di reperti è stato apposto con penna indelebile il codice numerico identificativo (n. SBM), per un rapido rinvenimento finalizzato a successive attività di studio.

Per ogni lotto selezionato è stata annotata la eventuale provenienza da raccoglitori di gruppi di lotti, distinguibili attraverso note del collezionista. All'interno del catalogo informatico è stata perciò introdotta una sigla identificativa di tali informazioni che è andata a costituire la colonna denominata "contenitore".

Durante lo studio del materiale costituente la Collezione è stata notata l'esistenza di lotti non segnalati nel Catalogo storico (PARENZAN, 1974b; 1977; 1985), perché sfuggiti all'attività di catalogazione svolta dal Parenzan o perché raccolti dallo stesso solo dopo la stesura dell'ultimo catalogo.

Si è quindi proceduto al completamento del *file* di catalogo *Excel* con le informazioni relative a tali reperti, segnalati come "fuori catalogo storico (FC)", nella colonna relativa al numero di catalogo.

La numerazione di questi reperti è stata apposta secondo le regole descritte e con porzione decimale del "n. SBM" consequenziale rispetto all'ultimo lotto menzionato in Catalogo storico, quando il lotto rinvenuto era riferibile, da cartellino, ad una specie già presente nel catalogo dattiloscritto, oppure "n. SBM" seguente rispetto a quello dell'ultima specie segnalata in Catalogo storico quando il lotto rinvenuto risultava riferibile ad una specie storicamente non nota per la Collezione. Nel caso dei reperti non menzionati dal catalogo dattiloscritto la nota storica è stata tratta dal cartellino.

Le note del catalogo storico non risultavano sempre totalmente coerenti con quelle presenti in cartellino (evidenziando probabili errori di stesura dei cataloghi da parte del collezionista). Di conseguenza, per alcuni lotti di reperti presenti in Collezione (e riferibili a specie segnalate in Catalogo storico) non è stato possibile accertare una corrispondenza con i dati del catalogo dattiloscritto. Tali reperti sono stati introdotti in elenco in qualità di lotti non compresi nei cataloghi storici (FC), seguendo le regole già descritte, per scongiurare imprecisioni di documentazione.

La collezione è stata oggetto di attività di aggiornamento della nomenclatura, in accordo con l'attuale collocazione tassonomica delle specie.

Il catalogo informatico è stato conseguentemente implementato attraverso l'introduzione delle informazioni relative alla nomenclatura aggiornata ("Bino-

mio proposto”) ed alle “note del revisore”, organizzate in 2 specifiche colonne.

La colonna delle “note del revisore” ha accolto informazioni relative allo stato ed alla importanza dei reperti, alla loro trattazione nell’opera “*La Carta di Identità dei Molluschi del Mediterraneo*” (PARENZAN, 1970; 1974; 1976a; b), nonché alle informazioni aggiuntive reperibili attraverso lo studio del cartellino e ad ulteriori dati impressi sui contenitori originari.

La stessa colonna ha accolto note per i lotti ancora non sottoposti ad attività di aggiornamento tassonomico, perché anche in questo caso risultava importante scongiurare la dispersione di informazioni utili che non era possibile trarre dai cataloghi storici ma si rendevano disponibili attraverso un esame diretto del lotto.

Il catalogo informatico *Excel* è stato, infine, proposto in un formato funzionale alla stampa, attraverso la sua conversione in documento per *Microsoft Word* (allegato). Si è scelto, in questo caso, di escludere le informazioni relative alle note del revisore, nonché agli originari contenitori che raccoglievano più lotti di specie, e di introdurre nell’elenco i soli reperti oggetto di revisione tassonomica, per motivi editoriali.

Al fine di realizzare un archivio fotografico della Collezione sono stati effettuati scatti digitali ad alta risoluzione (8 *Mega Pixel*; fotocamere digitali: *Panasonic Lumix DMC – TZ4*, *Canon EOS 350D*, *Nikon Coolpix S210*, dotate all’occorrenza di ottica Macro), relativi alla conservazione storica, ai reperti ed alla nuova conservazione, per almeno un lotto rappresentante di ciascuna specie menzionata in Catalogo storico. Si è operato sulla “collezione rappresentativa” di quella storica, ormai costituita, e proceduto alla selezione di almeno un lotto di reperti per ogni specie nota, escludendo alcuni lotti che, pur presentando una denominazione differente, erano riconducibili alla stessa specie perché individuavano sinonimie di specie oppure errori di battitura operati dal Parenzan durante la stesura dei cataloghi. Gli scatti sono stati organizzati in cartelle digitali rappresentanti, ciascuna, un lotto di reperti e recanti, ognuna, il codice numerico identificativo del lotto presente nel catalogo informatico della Collezione. Il *file* di catalogo per *Microsoft Word* è stato pertanto implementato attraverso l’introduzione di una colonna intitolata “foto” i cui *record* comprendono l’indicazione “SI” quando il lotto corrispondente è stato oggetto di archiviazione fotografica.

RISULTATI

I cataloghi storici (Fig. 2a-b) descrivono una collezione composta da 6438 lotti di materiale sia malacologico che riconducibile ad altri gruppi tassonomici.

Sono stati rinvenuti 357 lotti fuori catalogo storico. Di questi, tuttavia, 2 lotti sono relativi a materiale algale (calcareo).

Tra i 355 lotti di materiale malacologico fuori catalogo storico è stata verificata l'esistenza di 151 specie e di un genere (la cui specie è indeterminata) che non erano stati menzionati da Parenzan per la sua collezione, perché sfuggiti all'attività di catalogazione o ottenuti dallo stesso dopo la battitura dell'ultimo volume del catalogo storico (PARENZAN, 1985).




Fig. 2a: copertina del primo volume del Catalogo storico (PARENZAN, 1974b).




Fig. 2b: prima pagina del primo volume del Catalogo storico (PARENZAN, 1974b).

Sono stati selezionati e conservati 2928 lotti della collezione malacologica di Parenzan, che ora costituiscono la "Collezione Rappresentativa" di quella storica.

Il catalogo unico informatico e testuale della collezione, al termine del lavoro, comprendevano 6794 lotti di reperti, dei quali alcuni sono riferibili a specie di brachiopodi (organismi che costruiscono una struttura calcarea simile a quella di una conchiglia) segnalati in catalogo storico e 2 a specie algali (calcareae) rinvenute tra i lotti della collezione.

155 specie elencate nei cataloghi storici non sono state rinvenute tra i lotti disponibili, quindi sono state considerate disperse.

Anche se il materiale malacologico della collezione di Parenzan deriva principalmente da dragaggi effettuati con navi, una discreta porzione della collezione trae origine da attività di scambio intercorse con altri collezionisti italiani e stranieri.

L'attività di determinazione tassonomica dei lotti di reperti, in questi casi e per alcuni particolari gruppi tassonomici, non è stata sempre portata avanti dal collezionista. Pietro Parenzan affidava spesso i reperti allo studio da parte di esperti di specifici gruppi. Tali studiosi hanno lasciato importanti testimonianze del loro lavoro all'interno della collezione, così che questa, oggi, non rappresenta solo una raccolta di conchiglie, ma soprattutto una finestra sul pensiero tassonomico dei malacologi operanti al tempo. Tali informazioni sono rappresentate, oltre che dall'interpretazione delle specie offerta da parte degli specialisti, anche dai cartellini originali che affiancano quelli prodotti da P. Parenzan e da alcune note apposte dagli stessi sui contenitori storici dei reperti. Tra gli autori che hanno collaborato col Parenzan figurano esperti italiani e stranieri di rilievo, quali: Di Geronimo, Settepassi, Bombace, Palazzi, Micali, Panetta, Dell'Angelo, Binnekamp (Olanda), Carauso (Romania), Maldonado (Spagna), Salvini-Plaven (Austria).

Si veda, ad esempio, il lotto n. SBM: 371,02 relativo ad esemplari della specie *Clausinella paphia* (fig. 3a-f).




Fig. 3a: conservazione storica e nota di autore diverso da P. Parenzan.




Fig. 3b: cartellino autografo di P. Parenzan.



Fig. 3c: dettagli dei reperti.



Fig. 3d: dettaglio del reperto.



Fig. 3e: dettaglio del reperto.




Fig. 3f: nuova conservazione, comprendente la porzione di contenitore storico recante nota di autore diverso da P. Parenzan.

In questo caso (fig. 3a-f) è evidente una nota direttamente vergata, con penna indelebile, sulla bustina contenente il lotto di reperti, che reca la dicitura “*C. brogniarti*”, ovvero la determinazione della specie *Clausinella brogniarti* in contrapposizione alla identificazione proposta dal Parenzan che aveva riconosciuto, nel lotto di reperti, la specie *Clausinella paphia*. La calligrafia della nota sul contenitore è chiaramente quella di persona altra rispetto al professore, ed è pertanto ipotizzabile che la nota rappresentasse la correzione, nella determinazione della specie, operata da un malacologo al quale il professore si era rivolto per ottenere un confronto circa l’identificazione della specie.

1241 lotti della collezione rappresentativa, scelti casualmente, sono stati studiati presso il Dipartimento di Biologia Animale “Marcello La Greca” dell’Università degli Studi di Catania, al fine di proporre una determinazione aggiornata, in accordo con le attuali conoscenze in campo tassonomico. La nuova interpretazione delle specie è ora disponibile per ciascuno dei lotti studiati nel catalogo informatico, alla colonna denominata “Binomio proposto”. Si veda in allegato.

È stato realizzato un archivio fotografico di 1750 lotti della collezione. Per ogni lotto fotografato, fatta eccezione per quelli danneggiati o mancanti in uno degli elementi costituenti, è stata offerta una testimonianza della conservazione storica e di quella attuale. Per i lotti di conchiglie di dimensione massima superiore a 3 mm sono state effettuate alcune fotografie di dettaglio dei reperti costituenti il lotto e/o dell’esemplare più grande e meglio conservato tra questi (quando il lotto includeva più di un reperto) (fig. 4a-f: lotto n. SBM 1028,00). L’archivio è stato strutturato in cartelle digitali denominate, ciascuna, con il n. SBM corrispondente al lotto rispetto al quale le immagini si riferiscono.




Fig. 4a: conservazione storica.




Fig. 4b: cartellino.



Fig. 4c: dettaglio del reperto.



Fig. 4d: dettaglio del reperto.



Fig. 4e: dettaglio del reperto.



Fig. 4f: nuova conservazione.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro, assieme all'allegato catalogo dei lotti della Collezione Malacologica di Pietro Parenzan per i quali è attualmente disponibile l'aggiornamento della collocazione tassonomica, rappresenta un primo contributo al recupero di un importante patrimonio scientifico e documentario. La "Collezione rappresentativa" di quella storica è inoltre già visionabile da

parte degli studiosi del settore che potranno reperire, attraverso l'ausilio del catalogo informatico, una considerevole porzione di reperti (circa il 43%), oculatamente selezionata, che può quindi tornare ad offrirsi in qualità di archivio di dati ecologici storici.

BIBLIOGRAFIA

- DISNEY R. H. L., 1986 - Assessments using invertebrates: posing the problem. In M. B. Usher, ed. *Wildlife conservation evaluation*. Chapman and Hall, London, 271–293.
- DRINKROW D.R., CHERRY M.I., 1995 - Anuran distribution, diversity and conservation in South Africa, Lesotho and Swaziland. *South African Journal of Zoology* **30**, 82–90.
- FANELLI G., RUBINO F., BELMONTE G., 2002 - *The Marine Biology Station of Porto Cesareo. 1966-1999*. Edizioni del Grifo, Lecce, 228 p.
- HAWKSWORTH D. L., MOUND L. A., 1991 - *Biodiversity databases: the crucial significance of collections*. In D. L. Hawksworth, ed. *The biodiversity of microorganisms and invertebrates: its role in sustainable agriculture*. Proceedings of the first workshop on the ecological foundations of sustainable agriculture 1991. Commonwealth Agricultural Bureaux International, Oxon, United Kingdom, 17–29.
- HEYWOOD V. H., 1995 - *Global biodiversity assessment*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
- HOAGLAND K. E., 1989 - Socially responsible: in the 1990s natural history museums will focus their efforts on maintaining the diverse life of a healthy planet. *Museum News* (September/October): 50–52.
- JACKSON J.B.C., SALA E., 2001 - Unnatural oceans. *Sci. Mar.*, **65**, 273–281.
- KRESS W.J., HEYER W.R., ACEVEDO P., CODDINGTON J., COLE D., ERWIN T.L., MEGGERS B.J., POGUE M., THORINGTON R.W., VARI R.P., WEITZMAN M.J., WEITZMAN S.H., 1998 - Amazonian biodiversity: assessing conservation priorities with taxonomic data. *Biodiversity and Conservation* **7**, 1577–1587.
- KRISHTALKA L., HUMPHREY P.S., 2000 - Can natural history museums capture the future? *Bioscience*, **50**, 611–617.
- MAJER J. D., 1987 - *The role of invertebrates in conservation and biological survey*. Western Australian Department of Conservation and Land Management, Perth.
- MCCARTHY M.A., 1998 - Identifying declining and threatened species with museum data. *Biological Conservation* **83**, 9–17.
- PARENZAN P., 1970 - *Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo, Vol. I Gasteropodi*. Bios Taras Editrice, Taranto.
- PARENZAN P., 1974a - *Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo, Vol. II Bivalvi, prima parte*. Bios Taras Editrice, Taranto.
- PARENZAN P., 1974b - Collezione di Malacologia Ecologica. Catalogo. Documento inedito, dattiloscritto.
- PARENZAN P., 1976a - *Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo, Vol. II Bivalvi, seconda parte*. Bios Taras Editrice, Taranto.
- PARENZAN P., 1976b - *Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo, Bibliografia*. Bios Taras Editrice, Taranto.

- PARENZAN P., 1977 - Collezione di Malacologia Ecologica. Catalogo II. Documento inedito, dattiloscritto.
- PARENZAN P., 1985 - *Collezione di Malacologia Ecologica*. Catalogo III. Documento inedito, dattiloscritto.
- PONDER W.F., CARTER G.A., FLEMONS P., CHAPMAN R.R., 2001 - Evaluation of Museum Collection Data for Use in Biodiversity Assessment. *Conservation Biology*, **15** (3), 648–657.
- PONDER W., LUNNEY D., 1999 - *The other 99%: the conservation and biodiversity of invertebrates*. Transactions of the Royal Zoological Society of New South Wales, Mosman.
- PRENDERGAST J. R., QUINN R. M., LAWTON J. H., EVERS HAM B. C., GIBBONS D. W., 1993 - Rare species: the coincidence of diversity hotspots and conservation strategies. *Nature*, **365**, 335–337.
- ROY K., COLLINS A.G., BECKER B.J., BEGOVIC E., ENGLE J.M., 2003 - Anthropogenic impacts and historical decline in body size of rocky intertidal gastropods in southern California. *Ecology Letters*, **6**, 205–21
- SCUDERI D., 2007 - The recent discovery of a new section of the malacological collection of Andrea Aradas. *Bollettino Malacologico* **43** (1-8), 125–129.
- SKELTON P.H., CAMBRAY J.A., LOMBARD A., BENN G.A., 1995 - Patterns of distribution and conservation status of freshwater fishes in South Africa. *South African Journal of Zoology* **30**, 71–81.
- SUAREZ A.V., TSUTSUI N.D., 2004 - The value of museum collections for research and society. *Bioscience*, **54**, 66–74.
- VÄISÄNEN R., HELIÖVAARA K., 1994 - Hot-spots of insect diversity in northern Europe. *Annales Zoologici Fennici* **31**, 71–81.
- WILLIAMS P.L., PRANCE G.T., HUMPHRIES C.J., EDWARDS K.S., 1996 - Promise and problems in applying quantitative complementary areas for representing the diversity of some Neotropical plants (families Dichapetalaceae, Lecythidaceae, Caryocaraceae, Chrysobalanaceae and Proteaceae). *Biological Journal of the Linnean Society* **58**, 125–157.

n. SBM	Genere (o Taxon superiore)	Specie	Autore, ssp, var	note storiche	cat.	foto	Binomio proposto
1,32	<i>Abra</i>	<i>alba</i>		La Strea Porto Cesareo (detrito) 10 ago 1984 Parenzan legit	FC	SI	<i>Abra (Synedosmya) alba</i> (Wood W., 1802)
2,02	<i>Abra</i>	<i>longicallus</i>	(Scacchi)	Croc. "Bambu" 500 m (2 i. l v.) D. G. det 1967	2		<i>A. longicallus</i>
2,10	<i>Abra</i>	<i>longicallus</i>		72 Panetta leg.	FC	SI	<i>A. alba</i>
21,00	<i>Acelis</i>	<i>ascaris</i>	(Turt.)	Cattaro 10 m, dav. sorgente Gudic (4)	2	SI	<i>A. ascaris</i>
34,12	<i>Actaeon</i>	<i>tornatilis</i>		La Strea Porto Cesareo (detrito) 10 ago 1984 Parenzan legit	FC	SI	<i>Acteon tornatilis</i> (Linné, 1758)
40,00	<i>Adula</i>	<i>simpsoni</i>	Marshall	Arcip. Toscano, fra Corsica e Capraia, in legno - prof. 350 m (2) - Fulvio Giannini don., Luglio 1975	2	SI	<i>A. simpsoni</i>
43,00	<i>Aequipecten</i>	<i>commutatus</i>	(Monteros.)	Can. di Sicilia, (6) S. Grasso leg.	3	SI	<i>Aequipecten (Perapecten) commutatus</i> (Monterosato, 1875)
55,02	<i>Rissoa</i>	<i>carinata</i>	<i>f. ecarinata</i> Monts.	1016 (BDD. Pl. 35, nr. 4)	1	SI	<i>A. carinata</i>
58,09	<i>Alvania</i>	<i>cimicoides</i>			FC	SI	<i>A. cimicoides</i>
69,21	<i>Rissoa</i>	<i>montagui</i>		juv. Porto Cesareo - 4 m	3		<i>Alvania (Alvania) discors</i> (Allan, 1818)
69,22	<i>Rissoa</i>	<i>montagui</i>		fondo a Cistoseira, A. Vannelli leg. Porto Cesareo	3		<i>Alvania (Alvania) discors</i> (Allan, 1818)
85,02	<i>Pisina</i>	<i>punctulum</i>		Acitrezza (CT) - 10 cm c.ca su alghe brune IX 1977 S. Palazzi leg.	FC	SI	<i>Pisina glabrata</i> (Von Muehlfeldt, 1824)
88,24	<i>Amyclina</i>	<i>corniculum</i>	(Oliv.)	Spiazzetta di Piombino, L. Innocenti leg. 1977	FC	SI	<i>Nassarius (Gussonea) corniculum</i> (Oliv., 1792)
88,25	<i>Amyclina</i>	<i>corniculum</i>	<i>elongata</i> Monts.	Spiazzetta di Piombino, L. Innocenti leg. 1977	FC		<i>Nassarius (Gussonea) corniculum</i> (Oliv., 1792)
89,00	<i>Amyclina</i>	<i>tinei</i>	(Marav.)	Lago del Faro (Messina)	1	SI	<i>Nassarius tinei</i> <i>Nassarius (Gussonea) tinei</i> (Maravigna in Guérin, 1840)
100,13	<i>Angulus</i>	<i>incarnatus</i>	(L.)	(detr.) La Strea, ag. 1984	3	SI	<i>Tellina (Laciolina) incarnata</i> (Linné, 1761)
102,15	<i>Angulus</i>	<i>platanus</i>	(L.)	La Strea, ag. 1984 (1 v. juv.)	3		<i>Tellina (Peronaea) planata</i> (Linné, 1767)

113,15	<i>Aporrhais</i>	<i>pespelecani</i>	(f. <i>alterutra</i> Mont., <i>minor venetiensis</i> Coen, <i>incrassatus</i> Loc. <i>alterutra</i> <i>robusta</i> Sett., <i>alterutra robusta</i> <i>adunca</i> Coen.)	Largo foce Piave, prof. 13 m. Sett. 1974.	1		<i>Aporrhais pespelecani</i> (Linné, 1758)
152,00	<i>Barbatia</i>	<i>barbata</i>		561 (fondale fortemente inquinato)	1	SI	<i>Modiolus (Modiolus) barbatus</i> (Linné, 1758)
152,01	<i>Barbatia</i>	<i>barbata</i>	(L.)	Cattaro (endocitton)	1		<i>Barbatia (Barbatia) barbata</i> (Linné, 1758)
152,02	<i>Barbatia</i>	<i>barbata</i>	(L.) var. <i>elongata</i> B. D. D.	Campomarino 1969.	1		<i>Barbatia (Barbatia) barbata</i> (Linné, 1758)
152,03	<i>Barbatia</i>	<i>barbata</i>	(L.)	v. dett. juv., da 5 a 30 mm - 193, 217, 220, 221, 304	1		<i>Barbatia (Barbatia) barbata</i> (Linné, 1758)
152,04	<i>Barbatia</i>	<i>barbata</i>		S. Vito (Ta) aprile 1973.	1		<i>Barbatia (Barbatia) barbata</i> (Linné, 1758)
152,05	<i>Barbatia</i>	<i>barbata</i>		Molfetta ag. 1977 (prof. 12 m.) 1514	2		<i>Barbatia (Barbatia) barbata</i> (Linné, 1758)
153,00	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>	(Ad.)	304	1		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
153,01	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>	(Adams)	584	1		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
153,02	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>	(Ad.)	spiaggia Torre dell'Ovo 1972	1		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
153,03	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>		398, 587	1		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
153,05	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>	(A. Adams)	Spiaggia Monacizzo 1972.	1		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
153,06	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>	(A. Adams)	Golfo di Taranto	1		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
153,07	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>		Spiaggia Madonna D'Alhomare	1		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
153,08	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>	(Ad.)	Granitola, Tummellino leg. 1976	2		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
153,09	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>	(Adams.)	Sic. occ.(Granitola) (2) Tumm. leg. 1975	2	SI	<i>Barleia unifasciata</i> (Montagu, 1803)
153,10	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>		(4) 1315	2		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
153,11	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>	(Ad.)	Molfetta 1977 - 1512	2		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
153,12	<i>Barleeia</i>	<i>rubra</i>		Sicilia occid., Tummellino leg. 1975. - S. P. det.	3		<i>Barleia unifasciata</i> (Montagu, 1803)
154,00	<i>Barnea</i>	<i>candida</i>	(L.)	Is. Sahalin, Mar Nero	1	SI	<i>Barnea (Barnea) candida</i> (Linné, 1758)
155,00	<i>Bathyrca</i>	<i>frielei</i>	(Jeffr.)	Ionio, Panetta det.	1		<i>Bathyrca pectunculoides</i> (Seacchi, 1834)

156,00	<i>Bathyarca</i>	<i>pectunculoides</i>	(Seacchi)	Prof. 135 m, Porto Ceareo, D. Ger, leg.	1	<i>Bathyarca pectunculoides</i> (Seacchi, 1834)
156,01	<i>Bathyarca</i>	<i>pectunculoides</i>	(Ph.)	Canale di Sicilia, 500 m.	1	<i>Bathyarca pectunculoides</i> (Seacchi, 1834)
156,03	<i>Bathyarca</i>	<i>pectunculoides</i>	(Seacchi)	"Titano" 1959, 500 m (l v.) D. G. det.	2	<i>Bathyarca pectunculoides</i> (Seacchi, 1834)
157,00	<i>Bathyarca</i>	<i>philippiana</i>		(l3 v.) Basso Adriatico, 300 m prof.	1	<i>Bathyarca philippiana</i> (Nyst, 1848)
157,02	<i>Bathyarca</i>	<i>philippiana</i>	(Nyst)	"Titano" 1959, 500 m (l v.) D. G. det.	2	<i>Bathyarca philippiana</i> (Nyst, 1848)
158,00	<i>Bela</i>	<i>brachystoma</i>		Catt. 45	1	<i>Bela brachystoma</i> (Philippi, 1844)
158,01	<i>Bela</i>	<i>brachystoma</i>		Cattaro	1	<i>Bela brachystoma</i> (Philippi, 1844)
158,02	<i>Bela</i>	<i>brachystoma</i>	(Phil.)	Citro di S. Cataldo, Mar Grande di Taranto	1	<i>Mangelia unifasciata</i>
158,03	<i>Bela</i>	<i>brachystoma</i>	(Ph.)	7, 23	1	<i>Bela brachystoma</i> (Philippi, 1844)
158,04	<i>Bela</i>	<i>brachystoma</i>		(parecchi detr.) Cattaro	2	<i>Bela brachystoma</i> (Philippi, 1844)
158,05	<i>Bela</i>	<i>brachystoma</i>		Catt. 18	2	<i>Bela brachystoma</i> (Philippi, 1844)
160,00	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>		Catt. 24	1	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
160,01	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>	(Bl.)	587	1	<i>Mangelia</i> <i>cf.</i> <i>fieldeni</i> (Van Aartsen & Fehr de Wal, 1978 ex Monterosato ms.)
160,02	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>	(Blainv.)	721	1	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
160,03	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>		S. Vito (Taranto) Fasani leg. 1974	2	<i>M. costulata</i> (A) + <i>M. bertrandii</i> (B)
160,04	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>		Panetta det. Catt. 7	2	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
160,05	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>		Catt. 1	2	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
160,06	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>		1016	2	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
160,07	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>		1016	2	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
160,08	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>		1141	2	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
160,09	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>		Cattaro 7	2	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
160,11	<i>Bela</i>	<i>costulata</i>		Spaggia di Follonica, Piombino L. Innocenti leg. 1977 2 detrite	FC	<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)
161,01	<i>Bela</i>	<i>cycladensis</i>		(Panetta det.) 992	2	<i>Bela laevigata</i>
161,02	<i>Bela</i>	<i>cycladensis</i>		S. Vito (Taranto) aprile 1974, Fasani leg.	2	<i>Bela laevigata</i>
161,03	<i>Bela</i>	<i>cycladensis</i>		La Sirea	2	<i>Bela laevigata</i>
162,00	<i>Bela</i>	<i>gimmania</i>	(Risso)	Golfo di Taranto	2	<i>Bela</i> <i>cf.</i> <i>nebula</i> (Montagu, 1803)
162,01	<i>Bela</i>	<i>gimmaniana</i>		Panetta det.	2	<i>Bela</i> <i>cf.</i> <i>nebula</i> (Montagu, 1803)

163,01	<i>Bela</i>	<i>nebula</i>	<i>gimmaniana</i> (Risso)	juv. 997	1	<i>M. attenuata</i>
163,03	<i>Bela</i>	<i>nebula</i>	<i>gimmaniana</i>	536	1	<i>Bellaspira septangularis</i>
163,05	<i>Bela</i>	<i>nebula</i>	(Mtg.)	var. 1016	1	<i>Bela laevigata</i>
163,06	<i>Bela</i>	<i>nebula</i>	<i>gimmaniana</i> (Risso)	722	2	<i>Bela laevigata</i>
163,07	<i>Bela</i>	<i>nebula</i>	<i>gimmaniana</i>	556	2	<i>Bela</i> cf. <i>nebula</i> (Montagu, 1803)
163,08	<i>Bela</i>	<i>nebula</i>	<i>gimmaniana</i>	1016	2	<i>Bela nebula</i> (A) + <i>B. laevigata</i>
163,09	<i>Bela</i>	<i>nebula</i>	<i>gimmaniana</i>	La Strea	2	<i>Bela laevigata</i>
163,10	<i>Bela</i>	<i>nebula</i>	var. ?	La Strea	2	<i>Bela laevigata</i>
163,11	<i>Bela</i>	<i>nebula</i>	(Mtg.)	? var. 1016	2	<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)
165,00	<i>Bela</i>	<i>taprunensis</i>	(Pall.)	= Raphitoma Risano 5	1	<i>Bela menkhorsti</i> Van Aartsen, 1988
165,01	<i>Bela</i>	<i>taprunensis</i>		1141	2	<i>Bela taprunensis</i> (Pallary, 1904)
165,02	<i>Bela</i>	<i>taprunensis</i>		(Pan. det.) Spiaggia di Eraclea (Veneto) 1974	2	Vedi n. 516,09
166,00	<i>Bela</i>	<i>turgida</i>	Forb.	(stomaco di Astropecten), Bastia (Corsica), Carr. leg.	1	<i>Bela menkhorsti</i> Van Aartsen, 1988
166,01	<i>Bela</i>	<i>turgida</i>	var. <i>aegeensis</i>	1141	2	<i>Bela gimmania</i> auct. not Risso, 1826 (= <i>B. fuscata</i> (Desh., 1835))
166,03	<i>Bela</i>	<i>turgida</i>		(Panetta det.) Lesina 1106	2	<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)
166,04	<i>Bela</i>	<i>turgida</i>		556	2	<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)
166,05	<i>Bela</i>	<i>turgida</i>		Panetta det. 198	2	<i>Haedropleura septangularis</i> (Montagu, 1803)
167,00	<i>Bela</i> ?	<i>turgida</i>	<i>aegeensis</i> (Forb.)	La Strea, ag. 1984	3	<i>Bela menkhorsti</i> Van Aartsen, 1988
168,00	<i>Bellaspira</i>	<i>grimaldi</i>	(Dautz.)	(= Hedropleura) Granitola, Sic. occ. Tumm. leg.	2	<i>Rissoina</i> (<i>Rissoina</i>) <i>brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
169,00	<i>Bellaspira</i>	<i>septangularis</i>		215	1	<i>Haedropleura septangularis</i> (Montagu, 1803)
169,01	<i>Bellaspira</i>	<i>septangularis</i>	(Mtg.)	Risano 5 (Bocche di Cattaro,	1	<i>Haedropleura septangularis</i> (Montagu, 1803)
169,02	<i>Bellaspira</i>	<i>septangularis</i>	(Mtg.)	504	1	<i>Haedropleura septangularis</i> (Montagu, 1803)
170,00	<i>Bentonella</i>	<i>gaza</i>	Dall.	Spiaggia Miami (Ugento), 20/7/1982	3	<i>Ventrosia ventrosa</i> (Montagu, 1803)
173,00	<i>Bithynia</i>	<i>hawaderiana</i>	Bourg.	Mar Morto (prov. L. Tiberiade), 1977 Par. leg.	2	<i>Paludinella</i> cf. <i>littorina</i> + <i>Hydrobia</i> ?
174,00	<i>Bittium</i>	<i>arenarium</i>	Monta.	Ionio, Sett. det.	1	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)

174,01	<i>Bititium arenarium</i>												
175,00	<i>Bititium deshayesi</i>												
176,00	<i>Bititium jaderinum</i>												
176,01	<i>Bititium jaderinum</i>		Bries.				Cattaro 1,23 (tipico) Taranto, Sett. det. Monopoli 1310 Sedim. San Cataldo, Mar Grande Taranto 1963.						
176,02	<i>Bititium jaderinum</i>		Brus.				Mar Grande di Taranto, Set. det. Monopoli - 1309						
176,03	<i>Bititium jaderinum</i>						Monopoli - 1309						
177,00	<i>Bititium lacteum</i>		Phil.				Taranto, Sett. det.						
177,01	<i>Bititium lacteum</i>		Phil.				var. Taranto						
178,00	<i>Bititium latreillei</i>		Kob.				G. d. Taranto, Sett. det.						
178,01	<i>Bititium latreillei</i>		Kob.				Mar Grande, 7 - 10 m - Sett. det.						
178,03	<i>Bititium latreillei</i>		<i>ecosatum</i> Nords.				(?) (5) 1302						
178,04	<i>Bititium latreillei</i>												
178,05	<i>Bititium latreillei</i>						573						
178,06	<i>Bititium latreillei</i>						585,586						
179,00	<i>Bititium paludosum</i>		B. D. D.				G. d. Ta, Sett. det.						
179,01	<i>Bititium paludosum</i>		<i>gemmatum</i>				Monopoli (10) 1315						
179,02	<i>Bititium paludosum</i>												
180,00	<i>Bititium reticulatum</i>		<i>bifasciatum</i> (B. D. D.)				Setepassi det.						
180,01	<i>Bititium reticulatum</i>		var. <i>paludosa</i> B. D. D.				Sedim. S. Cataldo, Mar Grande, Sett. det.						
180,02	<i>Bititium reticulatum</i>						2 juv. detr. Corsica 100m - Carozza leg., Pan, det.						
180,03	<i>Bititium reticulatum</i>		var.?				Spiaggia Madonna D'Altomare						
180,05	<i>Bititium reticulatum</i>						Catt. 45						
180,07	<i>Bititium reticulatum</i>						Cattaro Panetta det.						
180,08	<i>Bititium reticulatum</i>		Da Costa				Set. det. Taranto						
180,09	<i>Bititium reticulatum</i>						Mar. di Ravenna, Tullio Parenzan leg. 1957						
180,10	<i>Bititium reticulatum</i>						Spiaggia Torre dell'Ovo						
180,11	<i>Bititium reticulatum</i>						juv. Catt. 45 - Panetta det.						
180,12	<i>Bititium reticulatum</i>						96, 100, 133, 134, 159, 193						
180,16	<i>Bititium reticulatum</i>						2° s. Mar Piccolo (centinaia)						

180,17	<i>Bittium</i>	<i>reticulatum</i>	(var.? <i>latreillei</i> , <i>paludosum</i> , <i>jadert</i> ?)	S. Vito (Mar Grande) (180)	2	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
180,18	<i>Bitium</i>	<i>reticulatum</i>	<i>exigua</i> Montis.	Golfo di Gabes, Tumm. leg. 1975	2	<i>Bittium jardetinum</i> (Brusina, 1865)
180,19	<i>Bittium</i>	<i>reticulatum</i>	<i>paludosum</i> BDD	(molti) Lago del Faro (Mess.) S. Giacobbe leg.	2	<i>Bittium jardetinum</i> (Brusina, 1865)
180,20	<i>Bittium</i>	<i>reticulatum</i>		Granitola, Tumm. leg. 1976 (Sicilia occ.)	2	<i>Bittium latreilli</i> (Payraudeau, 1826) + 1 <i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
180,21	<i>Bittium</i>	<i>reticulatum</i>		(6) Lago di Varano (2 con soli 2 cerchi spirali)	2	<i>Bittium scabrum</i> (Olivi, 1792)
180,23	<i>Bittium</i>	<i>reticulatum</i>	<i>jardetinum</i>	Mar Picc (la F. più sottile, dis. Nota Congr. Soc. It. Biol. Mar. Venezia 1975) 1027	2	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
180,25	<i>Bittium</i>	<i>reticulatum</i>		Mar Piccolo (le 2 forme più tozze) 1027	2	<i>Bittium latreilli</i> (Payraudeau, 1826)
180,25	<i>Bitium</i>	<i>reticulatum</i>		Spiazzia di Jesolo	FC	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
180,26	<i>Bittium</i>	<i>reticulatum</i>		572	FC	<i>Bittium latreilli</i> (Payraudeau, 1826)
180,27	<i>Bittium</i>	<i>reticulatum</i>	var. <i>paludosa</i>		FC	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
180,28	<i>Bittium</i>	(<i>reticulatum</i>)		Insenatura Veletri, Ston Yugoslavia Adr. ag. 72	FC	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
181,00	<i>Bitium</i>	<i>reticulatum</i> ?	<i>latreillei</i> (Payr.)	Catt. 15, 16, 23 ?	1	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
182,00	<i>Bittium</i>	<i>scabrum</i>	Olivi	G. d. Taranto, Sett. det.	1	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
182,01	<i>Bitium</i>	<i>scabrum</i>	Olivi	(v. forme Taranto, Sett. det.	1	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778) + 1 <i>Bittium scabrum</i> (Olivi, 1792)
182,02	<i>Bitium</i>	<i>scabrum</i>		(tipico) 01. - Seditim. NE Mar Piccolo, Sett. det.	FC	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
182,03	<i>Bittium</i>	<i>scabrum</i>			1	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778) + 3 <i>Bittium scabrum</i> (Olivi, 1792) (?)
185,00	<i>Bitium</i>	sp.	(<i>ulvae</i> Mts. ?)	564 (fondale inquinato)	1	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778) + 1 <i>Bittium latreilli</i> (Payraudeau, 1826)
186,00	<i>Bitium</i>	sp.		Catt. 24	1	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778) + <i>Bittium latreilli</i> (Payraudeau, 1826) (mischiate)
187,00	<i>Bitium</i>	sp.		Rio Ribadeo (Spagna, Atl. 13 sett. 1968 (sedim.))	1	<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
188,00	<i>Bitium</i>	sp.		Costa di Agrigento, F. Nat. leg.	1	Materiale microscopico molto vario (almeno 7 famiglie diverse!)
189,00	<i>Bittium</i>	sp.		1315	2	<i>Bittium latreilli</i> (Payraudeau, 1826)

191,00	<i>Bititium</i>	sp.				juv. di 1 mm - Monopoli - 40 m. Drag. 1314 - S. P. det.	3	<i>Bititium reticulatum</i>
192,00	<i>Bititium</i>	sp.				juv. - 1, 2 mm - coralligeno - 75 m, largo Porto Cesareo, S. P. det.	3	<i>Bititium latreilli</i> (Payraudeau, 1826)
193,00	<i>Bititium</i>	sp.				Spiangia di Lizzano (un centinato)	2	<i>Bititium reticulatum</i> (Da Costa, 1778) + <i>Bititium jaderinum</i> + 1 <i>Cerithiopsis</i> sp.
194,00	<i>Bititium</i>	sp.				Mar Piccolo (20)	2	Varie specie frammistate
195,00	<i>Bititium</i>	sp.				(7 j. 2 - 3 mm) Torre Ovo 40 m - Barbacovi leg.	2	<i>Cerithidium submamillatum</i> (3) + <i>B. latreilli</i> (3)
196,00	<i>Bititium</i>	sp.				La Strea (Porto Cesareo) (18)	2	<i>Bititium reticulatum</i> (Da Costa, 1778) + 1 <i>Bititium latreilli</i> (Payraudeau, 1826)
196,01	<i>Bititium</i>	sp.				La Strea (Porto Cesareo) costa sett. 28 dic. 1969	FC	<i>Bititium reticulatum</i> (Da Costa, 1778) + alcuni <i>Bititium latreilli</i> (Payraudeau, 1826)
197,00	<i>Bititium</i>	<i>tarentinum?</i>	Monteros.			713 (Sett. det.)	1	<i>Bititium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
197,01	<i>Bititium</i>	<i>tarentinum</i>	Monteros.			Mar Grande (Ta) - Sett. det.	1	<i>Bititium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
198,00	<i>Bititium</i>	<i>tesselatum</i>	(Mts.)			G. d. Ta - Sett. det.	1	<i>Pirenella conica</i> (Blainville, 1826)
199,00	<i>Bititium</i>	<i>ulvae</i>	Mis.			Catt. 19	1	<i>Bititium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
199,01	<i>Bititium</i>	<i>ulvae</i>	Mis.			Golfo di Taranto, Sett. det.	1	<i>Bititium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
199,02	<i>Bititium</i>	<i>ulvae</i>	Mis.			Spiangia di Eraclea (Adr.)	2	<i>Bititium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)
200,00	<i>Bivetia</i>	<i>cancellata</i>	(L.)			foss. Masser., Pl., Asti, Dell'Angelo leg.	1	<i>Cancellaria</i> (<i>Cancellaria</i>) <i>cancellata</i> (Linné, 1767)
201,00	<i>Bivonia</i>	<i>cristata</i>				304	1	<i>V. granulatus</i>
202,00	<i>Bivonia</i>	<i>gorensis</i>	(Gm.)			Molfetta 1977 - 1514	2	Anellide polichete
203,00	<i>Bivonia</i>	<i>granulata</i>	(Grav.)			253	1	<i>V. semisurrectus</i>
203,01	<i>Bivonia</i>	<i>granulata</i>				? 1633	FC	<i>V. semisurrectus</i>
203,02	<i>Bivonia</i>	<i>granulata</i>	(Grav.) <i>pinnicola</i> Montis.			Porto Cesareo	1	1 <i>Bititium latreilli</i> (Payraudeau, 1826)
204,00	<i>Bivonia</i>	<i>pteriae</i>	Par.			Prof. 60 m, Porto Cesareo	1	<i>V. semisurrectus</i>
204,01	<i>Bivonia</i>	<i>pteriae</i>				566	FC	<i>Serpulorbis arenaria</i>
205,00	<i>Bivonia</i>	<i>semisurrecta?</i>				384	1	<i>V. semisurrectus</i>
206,00	<i>Bivonia</i>	sp.				375	FC	Anellide polichete
207,00	<i>Bivonia</i>	sp.				La Strea	1	<i>V. granulatus</i>
208,00	<i>Bivonia</i>	sp.				375	1	<i>V. semisurrectus</i>
209,00	<i>Bivonia</i>	sp.				1705	3	Anellide polichete
210,00	<i>Bivonia</i>	<i>triquetra</i>	(Biv.)			Spiangia Madonna D'Altomare	1	<i>V. triqueter</i>

210.01	<i>Bivonia</i>	<i>triquetra</i>	(Biv.) <i>F. gregaria</i> Monts.	(det., su Patella) - fra Torre Zozzoli e Torre dell'Ovo, 1972.	1	<i>Dendropoma gaederopi</i> (?)
210.02	<i>Bivonia</i>	<i>triquetra</i>	(Biv.)	(2) spiaggia Madonna D'Altomare.	1	<i>Dendropoma gaederopi</i> (?)
210.03	<i>Bivonia</i>	<i>triquetra</i>	(Biv.)	Costa Neretina, dio. 1974.	1	<i>V. triquetra</i>
210.05	<i>Vermetus</i>	<i>triquetra</i> ?		386	FC	<i>V. semisurrectus</i>
212.00	<i>Bornia</i>	<i>corbuloides</i>	Phil.	Golfo di Taranto.	1	<i>Bornia sebetia</i> (Costa O.G., 1829)
213.00	<i>Bornia</i>	<i>sebetia</i>		(4 v.) La Strea	2	<i>Bornia sebetia</i> (Costa O.G., 1829)
213.01	<i>Bornia</i>	<i>sebetia</i>		CampoMarino	2	<i>Bornia sebetia</i> (Costa O.G., 1829)
213.02	<i>Bornia</i>	<i>sebetia</i>	(O. G. Costa)	Rio Ribadeo (Spagna Atl.) 1968	1	<i>Bornia sebetia</i> (Costa O.G., 1829)
213.03	<i>Bornia</i>	<i>sebetia</i>		299, 304	1	<i>Bornia sebetia</i> (Costa O.G., 1829)
213.04	<i>Bornia</i>	<i>sebetia</i>	(O. G. Costa)	La Strea, fondo a Geodia, prof. 1 m.	1	<i>Bornia sebetia</i> (Costa O.G., 1829)
213.05	<i>Bornia</i>	<i>sebetia</i>	(O. G. Costa)	spiaggia Madonna D'Altomare	1	<i>Bornia sebetia</i> (Costa O.G., 1829)
213.06	<i>Bornia</i>	<i>sebetia</i>	(O. G. Costa)	Mar Piccolo di Taranto.	1	<i>Bornia sebetia</i> (Costa O.G., 1829)
214.00	<i>Brachidontes</i>	<i>lineatus</i>	<i>ponticus</i>	Mar Nero	1	<i>Mytilaster lineatus</i> (Gmelin, 1791)
219.00	<i>Brechites</i>	<i>vaginiferum</i>		(Mar Rosso?) - D. Valéro don.	1	<i>B. vaginiferus</i>
224.03	<i>Buccinulum</i>	<i>corneum</i>		Golfo di Taranto	1	<i>Buccinulum corneum</i> (Linné, 1758)
224.04	<i>Buccinulum</i>	<i>corneum</i>		(racc. vivo) Lago del Faro, Messina, 1969.	1	<i>Buccinulum corneum</i> (Linné, 1758)
224.05	<i>Buccinulum</i>	<i>corneum</i>		G. di Taranto (6)	2	<i>Buccinulum corneum</i> (Linné, 1758)
224.07	<i>Buccinulum</i>	<i>corneum</i>		(2) var. col. rosso, Lampedusa 45 - 50 m, S. Grasso leg.	3	<i>Buccinulum corneum</i> (Linné, 1758)
224.08	<i>Buccinulum</i>	<i>corneum</i>		Spaggia Siponto (Adr.)	2	<i>Buccinulum corneum</i> (Linné, 1758)
224.09	<i>Buccinulum</i>	<i>corneum</i>		(2) Porto Cesareo (1 es. di 60 mm)	2	<i>Buccinulum corneum</i> (Linné, 1758)
224.10	<i>Buccinulum</i>	<i>corneum</i>		Granitola, Tumm. leg. 1976 (2)	2	<i>Buccinulum corneum</i> (Linné, 1758)
224.11	<i>Buccinulum</i>	<i>corneum</i>		Porto Cesareo 60 m III/1976	2	<i>Buccinulum corneum</i> (Linné, 1758)
225.00	<i>Buccinum</i>	<i>undatum</i>	L.	Oc. Atlantico - Mad. Kermarr. - Labisse don.	1	<i>Buccinum undatum</i> Linné, 1758
225.01	<i>Buccinum</i>	<i>undatum</i>	L.	(verniciato) Siracusa - Tursi don.	1	<i>Buccinum undatum</i> Linné, 1758
225.02	<i>Buccinum</i>	<i>undatum</i>	L.	(di 87 mm) Mediterraneo	1	<i>Buccinum undatum</i> Linné, 1758
225.03	<i>Buccinum</i>	<i>undatum</i>		(di 88 mm) subfoss.?, col. bruno - grig. seuro. Mediterr.	1	<i>Buccinum undatum</i> Linné, 1758
227.00	<i>Bulla</i>	<i>columnae</i>	Delle Chiaie	framm. Sedim. Mar Piccolo, Sett. det. 1957	1	<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792

228,00	<i>Bulla</i>	<i>subampulla</i>	(D'Orb.)	Fossile, Masserano, Plioc. Prov. Asti, D. Ang. leg.	1	SI	<i>Bulla subampulla</i> d'Orbigny, 1852
229,04	<i>Bullaria</i>	<i>fasciata</i>		juv. La Strea, ag. 1984	3	SI	<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
229,05	<i>Bullaria</i>	<i>fasciata</i>		juv. (= Retusa Mariateresae 1970), S. Maria del Mare, vicino Taranto, febr. 1976, S. Balzarzi leg. (2, di 2 mm)	2		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,00	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>	(Brug.)	2.J. (Ret. Mariateresae Par. 1970) costa Lama (Ta)	1		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,01	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>		(6) Porto Cesareo	1		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,02	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>	(Brug.)	(30) spiaggia Torre dell'Ovo	1		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,03	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>		561 (fondale fortemente inquinato)	1		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,04	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>		564 (fondale inquinato)	1		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,05	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>	(Brug.)	559 (fondale inquinato)	1		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,06	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>	(Brug.)	juv. 2 - 70mm. Messina, Micali leg.	1		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,07	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>		(190 es.) Spiaggia Madonna D'Altomare 1968.	1		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,08	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>		(6 det.) 221	2		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,09	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>		(2) Tre Fontane, Sicilia occ., Tumm. leg. 1975	2	SI	<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,10	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>		juv. - Di Stefano G. leg. apr. 1977 (Pisa)	2		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,11	<i>Bullaria</i>	<i>striata</i>		558	FC		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
230,12	(<i>Bullaria</i>)	<i>striata</i>		Spiaggia di Torre Lapillo 18 gen 68	FC		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
231,00	<i>Bullaria?</i>	sp.		(di 2 mm!) - spiaggia di Rizzano	1		<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792
232,00	<i>Bursa</i>	<i>marginata</i>		fossile - arg. plioceniche di Castelarciuato (Piacenza) B. Babbi don. 1976	2	SI	<i>Bufofania (Aspa) marginata</i> (Gmelin, 1791)
232,01	<i>Bursa</i>	<i>marginata</i>	Gmel.	Lampedusa, B. Babbi leg. 1975	2		<i>Bufofania (Aspa) marginata</i> (Gmelin, 1791)
233,00	<i>Bursa</i>	<i>spinosa</i>	Lamk.	Indo Pacifico	1	SI	<i>Bursa echinata</i> , Link, 1807
236,00	<i>Bythinella</i>	<i>schmidti</i>	(Küster, 1852)	Sorgente di Ponte nelle Alpi (Belluno), Stefano Palazzi don.	3	SI	<i>B. cf. shimidi</i>

248,00	<i>Ceraeum</i>	<i>trachea</i>	(moltiss. esemplari) Catt. 8 (Baia di Risano)	1	SI	Varie specie frammiste
249,01	<i>Calliostoma</i>	<i>conuloides</i>	juv. Porto Cesareo.	1	SI	
250,13	<i>Calliostoma</i>	<i>conulus</i>	Poesia piccola	FC	SI	<i>C. conulus</i>
251,03	<i>Calliostoma</i>	<i>dubium</i>	Sicilia, prof. 2 m (3) S. Grasso det. e don.	3	SI	<i>Calliostoma (Calliostoma) zizyphinum</i> (Linné,1758)
254,03	<i>Calliostoma</i>	<i>granulatum</i>	Monopoli 1968, = <i>C. papillosum</i> (Da Costa)	FC	SI	<i>Calliostoma (Ampullorochus) granulatum</i> (Von Born,1718) + <i>C. zizyphinum</i> (Linné,1758)
255,06	<i>Calliostoma</i>	<i>gualtierianus</i>	Monopoli - St. Pal. det.	FC	SI	<i>Calliostoma (Calliostoma) cfr. conulus</i> (Linné,1758)
256,00	<i>Calliostoma</i>	<i>kochi</i>	Mediterraneo (da Madrid)	1	SI	
259,00	<i>Calliostoma</i>	<i>neretinum</i>	Mare di Brindisi (?) Fiore leg.	1	SI	
259,02	<i>Calliostoma</i>	<i>neretinum</i>	Porto Cesareo	1	SI	
267,01	<i>Calliostoma</i>	<i>vicentiae</i>	(= <i>C. suturale</i> (Phil.)) - Mellilla, Marocco medit.	1	SI	
277,02	<i>Cantharus</i>	<i>d'orbigny</i>	La Strea, Porto Cesareo	1	SI	<i>Pollia dorbignyi</i> (Payraudeau,1826) (2 es.) + <i>Engina leucazona</i> (Philippi,1843) (1 es.)
280,00	<i>Cardiomya</i>	<i>costellata</i>	Golfo di Taranto	1	SI	<i>Cardiomya costellata</i>
305,13	<i>Cerastoderma</i>	<i>glaucum</i>	Torre Lapillo	1		<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret,1789)
305,25	<i>Cerastoderma</i>	<i>glaucum</i>	Foce Neretina (Adriatico or.)	1		<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret,1789)
305,28	<i>Cerastoderma</i>	<i>glaucum</i>	Mar Nero, Costanza, 1969.	1		<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret,1789)
305,38	<i>Cerastoderma</i>	<i>glaucum</i>	(L.) (tend. al col. giallo) - Margherita di Savoia (Adr.)	1		<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret,1789)
305,40	<i>Cerastoderma</i>	<i>glaucum</i>	sedim. Lago Alimini, costa adriatica 1972.	1		<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret,1789)
305,45	<i>Cerastoderma</i>	<i>glaucum</i>	155 v. detr. Spiaggia Torre dell'Ovo, 1972.	1		<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret,1789)
306,03	<i>Cerastoderma</i>	<i>lamarcki</i>	567	1		<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret,1789)
307,05	<i>Cerastoderma</i>	<i>glaucum</i>	(detr.) Jesolo 2 - 3 m	2		<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret,1789)
307,06	<i>Cerastoderma</i>	<i>glaucum</i>	(tendenza più o meno spiccata.) Valve (26) subfossili ? Spiaggia Eraclea (Alto Adriatico)	2		<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret,1789)

307,12	<i>Cerastoderma</i>	<i>glaucum</i>	con Balanus sp. sp. Mar Piccolo 1037	2	<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret, 1789)
309,07	<i>Ceratostoma</i>	<i>erinaceus</i>	6 m. 1700	3	<i>Oenebra erinacea</i>
311,00	<i>Cerithiella</i>	<i>cylindrata</i>	721 (Jeffr.)	1	<i>Bititium latreilli</i>
312,00	<i>Cerithiopsis</i>	<i>bilineata</i>	Porto Cesareo - 3 m	3	<i>Dizoniopsis</i> cf. <i>coppolae</i>
312,01	<i>Cerithiopsis</i>	<i>bilineata</i>	Porto Cesareo	FC	<i>Dizoniopsis coppolae</i>
313,00	<i>Cerithiopsis</i>	<i>metaxae</i>	(= rugulosa) 10 mm - Panetta det. 536	1	<i>Metaxia metaxa</i>
314,00	<i>Cerithiopsis</i>	<i>minima</i>	Stretto Messina, 30 m. - Micali leg.	1	<i>C. minima</i>
314,01	<i>Cerithiopsis</i>	<i>minima</i>	juv. 1, 9 mm - 382	1	<i>C. minima</i>
315,01	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	Catt. 7	1	<i>C. cf. fayalensis</i>
315,02	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	(= C. metaxae D. Ch.) 556	1	<i>Bititium reticulatum</i>
315,03	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	529	1	<i>Metaxia metaxa</i>
315,04	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	408	1	<i>Metaxia metaxa</i>
315,05	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	537	1	<i>Metaxia metaxa</i>
315,06	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	505	1	<i>Metaxia metaxa</i>
315,07	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	(2) Houmt - Souk (Is. Gerba) ott. 1974.	1	<i>Bititium reticulatum</i>
315,08	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	Spiaggia di Eralea (Adr., Veneto)	2	<i>Bititium reticulatum</i>
315,09	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	304	2	<i>Metaxia metaxa</i>
315,13	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	533	FC	<i>Metaxia metaxa</i>
315,14	<i>Cerithiopsis</i>	<i>rugulosa</i>	1315	FC	<i>C. cf. fayalensis</i>
316,01	<i>Cerithiopsis</i>	<i>tubercularis</i>	Stretto Messina, 30 m. - Micali leg.	FC	<i>C. tubercularis</i>
318,00	<i>Cerithium</i>	<i>alucastrum</i>	f. a Peyss. polymorpha, 65 - 70 m. Porto Ces.	1	<i>C. alucastrum</i>
318,01	<i>Cerithium</i>	<i>alucastrum</i>	(detr.) Largo foce Piave 13 m, Jesolo 1974	2	<i>C. alucastrum</i>
318,02	<i>Cerithium</i>	<i>alucastrum</i>	Jesolo 2 - 3 m	2	<i>C. alucastrum?</i>
320,00	<i>Cerithium</i>	<i>kochi</i>	Barash leg.	1	<i>C. kochi</i>
320,01	<i>Cerithium</i>	<i>kochi</i>	Israele, leg. Haas et Mienis V/1971, Mienis don.	2	<i>C. kochi</i>
322,17	<i>Cerithium</i>	<i>rupestre</i>	Granitola (2) Tuminello leg. 1976	2	<i>C. lividulum</i>
323,00	<i>Cerithium</i>	<i>scabridum</i>	Shimona, Israele - Barash leg.	1	<i>C. scabridum</i>

324,38	<i>Cerithium tuberculatum</i>	<i>v. hirta</i> BDD	Fondo a Zoosterateee, 2° s. Mar Piccolo	2	<i>C. vulgatum</i>
325,00	<i>Chama circinnata</i>	Monts.	Catt. 39, 43	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758) + <i>Pseudochama gryphina</i> (Lamarck,1819)
326,00	<i>Chama gryphina</i>	Lamck.	juv. Porto Cesareo	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
326,01	<i>Chama gryphina</i>	Lamck.	(detr.) Porto Cesareo	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,00	<i>Chama gryphoides</i>		juv. 377	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,02	<i>Chama gryphoides</i>	var. <i>ridella</i> de Gregorio	Golfo di Taranto	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,03	<i>Chama gryphoides</i>	L.	Cattaro	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,04	<i>Chama gryphoides</i>	L.	Cattaro, f. a Cladocora	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,05	<i>Chama gryphoides</i>	L.	juv. 567	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,06	<i>Chama gryphoides</i>	L.	Sicilia meridionale, F. Nat. leg.	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758) + <i>Pseudochama gryphina</i> (Lamarck,1819)
327,08	<i>Chama gryphoides</i>	L.	juv. mag - 18 mm - 381	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,09	<i>Chama gryphoides</i>	L.	juv. 236	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,10	<i>Chama gryphoides</i>	L.	juv (due tipi v. sup.) sp. Mad. D'Altomare.	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,11	<i>Chama gryphoides</i>	L.	(7 v. sup. juv.) Sedim. NE Mar Piccolo.	1	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,13	<i>Chama gryphoides</i>		(racc. vivi) 1309	2	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,14	<i>Chama gryphoides</i>		(= unicomis Brug.) - Molfetta 1977 - 1512	2	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,22	<i>Chama gryphoides</i>		(1 v. inf. juv.detr.) 1893	FC	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
327,23	<i>Chama gryphoides</i>		9 v. sup. j. 1853	FC	<i>Chama gryphoides</i> (Linné,1758)
328,00	<i>Chamela gallina</i>		juv. 2 - 3 mm Spiaggia di Eraclea (Veneto)	2	NC
328,03	<i>Chamela gallina</i>		Marigh. di Savoia (Adr-), disegno e colore Marcati	2	<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
328,04	<i>Chamela gallina</i>		(32 juv., 5 - 8 mm e pit) 1111	2	<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
328,05	<i>Chamela gallina</i>		juv. da 4 a 10 mm (una sessantina) 1115	2	<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
328,07	<i>Chamela gallina</i>		(46 juv.) Vieste 5 - 6 m 1140	2	<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
328,10	<i>Chamela gallina</i>		Spiaggia Mondello (Sic.) Tiziana Parenzan leg. 1976	2	<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)

328,17	<i>Chamelea</i>	<i>gallina</i>			juv. 1016	1	<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
328,18	<i>Chamelea</i>	<i>gallina</i>	(L.)	Carchasson 1969		1	<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
328,23	<i>Chamelea</i>	<i>gallina</i>	(L.)	Golfo di Napoli		1	<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
328,29	<i>Chamelea</i>	<i>gallina</i>		La Coruna, Spagna, Atlantico, sett. 1968.		1	<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
328,30	<i>Chamelea</i>	<i>gallina</i>	(L.)	135 v. - Spiaggia Mangherita di Savoia (Adr.) 1973.		1	<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
328,38	<i>Chamelea</i>	<i>gallina</i>		Sp. Castellameta Marina. Apr. 73.	FC		<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
329,01	<i>Chamelea</i>	<i>triangularis</i>		(1 v. detr.) Spiaggia di Eraclea	2		<i>Chamelea gallina</i> (Linné,1758)
332,04	<i>Chauvetia</i>	<i>minima</i>	(Mfg.)	Sic. occ., Tuminello leg. 1975	2		<i>Chauvetia turritellata</i> (Deshayes, 1835)
334,07	<i>Chione</i>	<i>ovata</i>		(12 v. j. detr.) Torre Ovo 40 m, Barbacovi leg.	2		<i>Timoclea ovata</i> (Pennant,1777)
338,01	<i>Chiton</i>	<i>olivaceus</i>		Catt. 9, 31		1	<i>Chiton (Rhysosoplax) olivaceus</i> Spengler,1797
338,06	<i>Chiton</i>	<i>olivaceus</i>		juv. in col. Cladocora, Cattaro.		1	<i>Chiton (Rhysosoplax) corallinus</i> (Risso,1826)
338,07	<i>Chiton</i>	<i>olivaceus</i>		Cattaro		1	<i>Chiton (Rhysosoplax) olivaceus</i> Spengler,1797
338,10	<i>Chiton</i>	<i>olivaceus</i>		Ampolla, Tarragona. Altimira leg.	2		<i>Chiton (Rhysosoplax) olivaceus</i> Spengler,1797
338,11	<i>Chiton</i>	<i>olivaceus</i>		La Strea, ag. 1984	3	SI	<i>Chiton (Rhysosoplax) olivaceus</i> Spengler,1797
339,00	<i>Chiton</i>	<i>rissoi</i>		(segm. stacc., detr.) Mar Grande Taramo, Sett. det.	1	SI	<i>Ischnochiton (Ischnochiton) rissoi</i> (Payraudeau,1826)
340,00	<i>Chlamys</i>	<i>bruei</i>		Catt. 1	2	SI	<i>Aequipecten (Aequipecten) opercularis</i> (Linné,1758)
340,01	<i>Chlamys</i>	<i>(bruei)</i>		(12 v.) Catt. 1	2		<i>Aequipecten (Aequipecten) opercularis</i> (Linné,1758)
342,06	<i>Chlamys</i>	<i>glaber</i>		567	1		<i>Chlamys (Proteopecten) glabra</i> (Linné,1758)
342,10	<i>Chlamys</i>	<i>glabra</i>		Adriatico	1		<i>Chlamys (Proteopecten) glabra</i> (Linné,1758)
342,12	<i>Chlamys</i>	<i>glabra</i>		(8 v.) Tirreno 1938	2		<i>Chlamys (Proteopecten) glabra</i> (Linné,1758)
343,00	<i>Chlamys</i>	<i>inflexa</i>	Poli	f. a Peyss. polym. - Porto Cesareo.	1	SI	<i>Pseudamussium (Peplum) clavatum</i> (Poli,1795)

344,00	<i>Chlamys</i>	<i>multistriata</i>	<i>multistriata</i>	(gialla) 530	1	<i>Chlamys (Chlamys) multistriata</i> (Poli,1795)
344,01	<i>Chlamys</i>	<i>multistriata</i>	<i>multistriata</i>	Gargano 6 - 7 m (3 v.) 1156	2	<i>Chlamys (Chlamys) multistriata</i> (Poli,1795)
347,03	<i>Proteopecten</i>	<i>proteus</i>	<i>amphicyrtus</i> (Loc.)	Adriatico 1956	1	<i>Chlamys (Proteopecten) proteus</i> (Dillwyn,1817 ex Solander ms.)
351,26	<i>Chlamys</i>	<i>varia</i>	(L.)	(col. aranciato) Tirreno.	1	<i>Chlamys (Chlamys) varia</i> (Linné,1758)
351,30	<i>Chlamys</i>	<i>varia</i>		(juv.) Largo foce Piave, 13 m	2	<i>Chlamys (Chlamys) varia</i> (Linné,1758)
351,31	<i>Chlamys</i>	<i>varia</i>		(1 v. rossa) Spiaggia di Eraclea (Adr. sett.)	2	<i>Chlamys (Chlamys) varia</i> (Linné,1758)
355,01	<i>Cingula</i>	<i>cingillus</i>	(Montagu) ? Sp.	Mad. D'Altomare 1969.	1	<i>Rissoa violacea</i>
356,00	<i>Cingula</i>	<i>laevis</i>	(Monts)	Molfetta 1977 - 1508	2	<i>SI</i>
358,00	<i>Cingula</i>	<i>semistriata</i>		Stefano Palazzi det.	3	<i>Crisilla semistriata</i> (Montagu,1808)
362,00	<i>Cionella</i>	<i>acicula</i>	Müll.	(sp. litorale, apice rotto) Mar Piccolo 1960 - 61	2	<i>SI</i>
363,04	<i>Circomphalus</i>	<i>casinus</i>	<i>aradasi</i>	567	1	<i>Venus (Venus) verrucosa</i> Linné,1758
363,05	<i>Circomphalus</i>	<i>casinus</i>	<i>aradasi</i>	juv. 376	1	<i>Venus (Venus) verrucosa</i> Linné,1758
363,07	<i>Circomphalus</i>	<i>casinus</i>	<i>aradasi</i> (B. D. D.)	juv. 4 - 9 mm. 96 109	1	<i>Venus (Venus) verrucosa</i> Linné,1758
363,10	<i>Circomphalus</i>	<i>casinus</i>		3 km occ. di Torre Colimena, dic. 1968	1	<i>Venus (Venus) verrucosa</i> Linné,1758
363,11	<i>Circomphalus</i>	<i>casinus</i>	(L.)	juv. 96	1	<i>Venus (Circomphalus) casina</i> Linné,1758
363,14	<i>Circomphalus</i>	<i>casinus</i>		(4 v.) Basso Adriatico 250 m.	1	<i>Venus (Circomphalus) casina</i> Linné,1758
365,00	<i>Cithna</i>	<i>tenella</i>	(Jeffr.)	Cr. Ab. RA 2300, 2400, 4210	1	<i>Benthonella tenella</i> (Jeffreys,1869)
365,01	<i>Cithna</i>	<i>tenella</i>	(Jeffr.)	Cr. Ruth Ann, 2300 m	2	<i>Benthonella tenella</i> (Jeffreys,1869)
365,02	<i>Cithna</i>	<i>tenella</i>	(Jeffr.)	RA 7, 2300 m, Ionio 1969, D. Ger. det.	2	<i>Benthonella tenella</i> (Jeffreys,1869)
365,03	<i>Cithna</i>	<i>tenella</i>	(Jeffr.)	RA 2, 1969, 2300 mm D. Ger. det.(5)	2	<i>Benthonella tenella</i> (Jeffreys,1869)
366,00	<i>Clanculus</i>	<i>corallinus</i>	(Gmel.) var. <i>atra</i>	sp. Lizzano	1	<i>C. corallinus</i>
366,01	<i>Clanculus</i>	<i>corallinus</i>	var. <i>atra</i> Monts.	(= brunnea Rév.) sp. Campomarino 1969.	1	<i>C. corallinus</i>
366,03	<i>Clanculus</i>	<i>corallinus</i>		Cattaro	1	<i>C. corallinus</i>
366,07	<i>Clanculus</i>	<i>corallinus</i>		Catt. 39	1	<i>C. corallinus</i>
366,10	<i>Clanculus</i>	<i>corallinus</i>	v. <i>atra</i> Monts.	Mad. D'Altomare	2	<i>C. corallinus</i>

367,04	<i>Clanculus</i>	<i>eructatus</i>		Granitola, Sic. occ., Tuminello leg. 1975	2	<i>C. eructatus</i>
368,00	<i>Clanculus</i>	<i>jussieui</i>		193	1	<i>C. jussieui</i>
368,02	<i>Clanculus</i>	<i>jussieui</i>	(Papyr.)	580	1	<i>C. jussieui</i>
368,05	<i>Clanculus</i>	<i>jussieui</i>	(Papyr.)	Costa Nereina (una ventina) (colore nero), f. a Cistoseira Porto Cesareo, sett. 1978 - Antonella Vanelli leg.	3	<i>C. jussieui</i>
368,08	<i>Clanculus</i>	<i>jussieui</i>				
368,10	<i>Clanculus</i>	<i>jussieui</i>		Gibbula sp., G. di T.	FC	<i>C. jussieui</i>
369,08	<i>Clausinella</i>	<i>brogniarti</i>	<i>scalaris</i> (Bromm)	Catt. 5	2	<i>C. brogniarti</i>
369,09	<i>Clausinella</i>	<i>brogniarti</i>		590	FC	<i>C. brogniarti</i>
370,00	<i>Clausinella</i>	<i>fasciata</i>		590	1	
371,02	<i>Clausinella</i>	<i>paphia</i>	(L.)	10 v. 1001	1	
373,01	<i>Clavagella</i>	<i>aperta</i>	Sow.	(tub. calcareo detrito) 381	2	<i>C. aperta</i>
373,02	<i>Clavagella</i>	<i>aperta</i>		(tubo calc. di 40 mm) 176	2	<i>C. aperta</i>
375,02	<i>Clavus</i>	<i>maravignae</i>		juv. 1010	1	<i>Crassopleura incrassata</i>
375,03	<i>Clavus</i>	<i>maravignae</i>		1008	1	<i>Crassopleura incrassata</i>
375,05	<i>Clavus</i>	<i>maravignae</i>		394, 516	1	<i>Crassopleura incrassata</i>
375,07	<i>Clavus</i>	<i>maravignae</i>	(Biv.)	381	1	<i>Crassopleura incrassata</i>
377,00	<i>Clelandella</i>	<i>militare</i>	(Brocchi)	juv. Basso Adriatico 200 m.	1	<i>C. militaris</i>
378,00	<i>Clelandella</i>	<i>millegrana</i> (?)		(?) 587	1	
381,01	<i>Cocculina</i>	<i>mamilla</i>		n. sp. Di Ger., RA 7, 2300 m (1 di 0, 8 mm - PARATIPO)	2	<i>C. ionica</i> Nordsteeck, 1973
383,05	<i>Colubraria</i>	<i>reticulata</i>		Brindisi, Mazzetti leg.	1	<i>C. reticulata</i>
383,07	<i>Colubraria</i>	<i>reticulata</i>	(Blainv.)	Granitola (2) Tumm. leg. 1976	2	<i>C. reticulata</i>
384,01	<i>Columbella</i>	<i>rustica</i>	(L.)	(albi) Porto Cesareo	1	<i>C. rustica</i>
384,03	<i>Columbella</i>	<i>rustica</i>		juv. 3 - 9 mm (65 es.) Mad. D'Altomare.	1	<i>C. rustica</i>
384,04	<i>Columbella</i>	<i>rustica</i>	<i>var. striata</i> Duclous	Palermo, Bombace leg.	1	<i>Columbella</i> sp. (sembra una specie tropicale)
384,09	<i>Columbella</i>	<i>rustica</i>		(26 juv. con pag. e detr.) 87 93 172	1	<i>C. rustica</i>
384,13	<i>Columbella</i>	<i>rustica</i>		35 es. detr. (grad. compl. decol.): La Strea	1	<i>C. rustica</i>
384,16	<i>Columbella</i>	<i>rustica</i>		Fra Campomarino e T. Collimena (40), var. col. - 1975	2	<i>C. rustica</i>

384,17	<i>Columbella</i>	<i>rustica</i>		Costa mer. S. Pietro (2) prof. 0, 20 m - 1975	2		<i>C. rustica</i>
386,00	<i>Comarmondia</i>	<i>gracilis</i>		Monopoli 8 m -(2) 1302	2	SI	
388,00	<i>Comus</i>	<i>broccii</i>	Bronn	(1 ad., 1 juv.) Corrisponde alla fot. n. 7 della Tav. 17 in Caprotti: Malacofauna d. piacentiano (Pliocene Castell'Arquato), Golfo di Gabes, prof. 0, 50 m, Tumm. leg.	2	SI	<i>C. mediterraneus</i>
391,03	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>	ater Phil.	Lago del Faro 0, 5 - 10 m, V. 1967.	1	SI	<i>C. mediterraneus</i>
391,04	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>	v. <i>alticonica</i> Pallary	Porto Cesarea, Is. Conigli.	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,08	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		551, 559	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,09	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		SINISTRORSA - Costa Azzurra, Cap Benat, D. Valéro leg.	1	SI	<i>C. mediterraneus</i> (sinistrostro)
391,10	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>	(Gm.)	bianco. Vivente sulle sabbie calcaree dell'Isola di Djerba (Tunisia), Demise Valéro leg. 1972	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,12	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		(spira alta, juv.) 710	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,19	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		562 (fondo inquinato)	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,20	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		juv. (alc. centinaia, detr.) "La Strea", Porto Cesarea	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,21	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>	Brug.	juv. 385	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,22	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		(juv. detr.) 504	1	SI	<i>C. mediterraneus</i>
391,24	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		juv. 2 e 4 mm - Punta Rondinella (Taranto)	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,25	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		juv. 3 e 5 mm, detr. (in Geodia), insen. La Strea, 1966.	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,27	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		var. (spirale alta) juv. Porto Cesarea 1968.	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,30	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		(2 gr. detr.) spiaggia Campo Marino 1969.	1		<i>C. mediterraneus</i>
391,31	<i>Comus</i>	<i>mediterraneus</i>		Spaggia di Torre Chianca, magg. 1972.	1		<i>C. mediterraneus</i>

391,32	Conus	mediterraneus	(10, da 9 a 8 mm, spir. alta) - Houmt Souk (Djerba)	1	<i>C. mediterraneus</i>
391,33	Conus	mediterraneus	(34, da 8 a 26 mm) - Houmt Souk, Is. Gerba, Tunisia 1974.	1	<i>C. mediterraneus</i>
391,34	Conus	mediterraneus	(f. a spira alta, es. corroso) spiaggia CampoMarino.	1	<i>C. mediterraneus</i>
391,36	Conus	mediterraneus	(2 juv. 4 e 7 mm) ? f. ater? Lago del Faro, 5/76	2	<i>C. mediterraneus</i>
391,42	Conus	mediterraneus	juv.(spira eccez. alta) - Porto Cesareo, - 2m	3	<i>C. mediterraneus</i>
391,43	Conus	mediterraneus	juv. 2 mm - Spiaggia di Marini, 20/7/1982	3	<i>C. mediterraneus</i>
391,44	Conus	mediterraneus	juv. (detr., alc. continua) 96, 132, 133, 172, 193, 236	1	<i>C. mediterraneus</i>
391,46	Conus	mediterraneus	Porto Cesareo	1	SI <i>C. mediterraneus</i>
391,47	Conus	mediterraneus	juv. detr. (grad. decol.) es. - La Strea	1	<i>C. mediterraneus</i>
391,48	Conus	mediterraneus	2 detr. - Mar Piccolo 1037	2	<i>C. mediterraneus</i>
391,49	Conus	mediterraneus	(3 detr. ? subfoss. ?) Mar Piccolo - 1037	2	<i>C. mediterraneus</i>
391,51	Conus	mediterraneus	(juv. detr.) Siponto (Adr.)	2	<i>C. mediterraneus</i>
391,52	Conus	mediterraneus	S. Cataldo di Lecce (Adr.) Barbacovi leg. (?)	2	<i>C. mediterraneus</i>
391,54	Conus	mediterraneus	(alc. caratt. di ater) Costa merid. Is. S. Pietro, 1975	2	<i>C. mediterraneus</i>
391,55	Conus	mediterraneus	Golfo di Gabes (2 detr.) Tumminello leg.	2	<i>C. mediterraneus</i>
393,00	Coralliophila	alucoides	Catt. 23	1	SI 1 es. juv <i>Bolinus brandaris</i> + 1 es. juv. <i>Hexaplex trunculus</i>
393,03	Coralliophila	alucoides	juv. 567	1	<i>Muricopsis</i> cf. <i>cevikieri</i> Howart, 2005
394,01	Coralliophila	lamellosa	Costa Catalana - Alimira leg. 1977	3	SI <i>C. lamellosa</i>
395,00	Coralliophila	meyendorffi	1019	1	SI <i>C. meyendorffi</i>
396,02	Coralliophila	spadae	587	1	SI <i>Coralliophila meyendorffi</i>
397,07	Corbula	gibba	197 229	1	SI <i>C. gibba</i>

397,10	<i>Corbula gibba</i>		juv. 2, 5 - 4 mm - Catt. 18	1	<i>C. gibba</i>
397,11	<i>Corbula gibba</i>	Olivi	f. ad alghe, 2° s. Mar Piccolo di Ta.	1	<i>C. gibba</i>
397,18	<i>Corbula gibba</i>		Mar Piccolo (Ta) 1036	2	<i>C. gibba</i>
397,19	<i>Corbula gibba</i>		(4500) Mar Piccolo 1034	2	<i>C. gibba</i>
397,31	<i>Corbula gibba</i>		720	FC	<i>C. gibba</i>
399,02	<i>Crassostrea angulata</i>	(Lmk.)	Arcachon 1969.	1	<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)
399,05	<i>Crassostrea angulata</i>	(Lameck.)	Mediterraneo occidentale	1	<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)
400,24	<i>Crassostrea gigas</i>		(= angulata) Ristorante di Napoli, prov. dichiarata: Puglia (2)	2	<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)
412,01	<i>Crepidula moulini</i>		Porto Cesareo 1968	FC	<i>Crepidula gibbosa</i> DeFrance, 1818
414,05	<i>Crepidula unguiformis</i>	Lameck.	Acì Castello, Catania.	1	<i>Crepidula unguiformis</i> Lamarck, 1822
419,00	<i>Ctena decussata</i>	(O. G. Costa)	Catt. 5	1	<i>Ctena decussata</i> (Costa O.G., 1829)
419,06	<i>Ctena decussata</i>		(v. int. gialle) sp. Madonna D'Altomare.	1	<i>Ctena decussata</i> (Costa O.G., 1829)
419,09	<i>Ctena decussata</i>		(1 int. juv., 10 v., alc. 3 mm) 1315	2	<i>Ctena decussata</i> (Costa O.G., 1829)
421,09	<i>Cultrensis</i>	Coen	(14 l., 15 v.) Gargano 14 m 1167	2	<i>Phaxas pellucidus</i>
429,00	<i>Cyclope brasinae</i>	(Andr.)	Mar Nero, Carausu det.	1	<i>Cyclope brasinae</i> (Andrussov)
431,00	<i>Cyclonassa neritea</i>	Myrs.	detr. Lago Alimini, costa Adr.	1	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
431,01	<i>Cyclonassa neritea</i>		Mar Piccolo (62) 1024	2	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
431,03	<i>Cyclonassa neritea</i>	Mts.	Marina di Ravenna, T. Par. leg. 1957, Sett, det.	1	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
431,04	<i>Cyclope neritea</i>	L.	77	1	<i>Cyclope (Cyclope) pellucida</i> (A) + <i>C. neritea</i> (B)
431,05	<i>Cyclope neritea</i>	(L.)	Catt. 18	1	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
431,07	<i>Cyclope neritea</i>	(L.)	Golfo di Taranto	1	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
431,08	<i>Cyclope neritea</i>	(L.)	Spiaaggia di Barletta (Adriatico)	1	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
431,09	<i>Cyclope neritea</i>	(L.)	Lago del Faro (Messina)	1	<i>Cyclope (Cyclope) pellucida</i> Risso, 1826
431,10	<i>Cyclope neritea</i>		"La Strea"	1	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)

431,11	Cyclope	neritea	sp.	Mad. D'Altomare.	1	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>pellucida</i> Risso, 1826
431,12	Cyclope	neritea		Isola Sahalin, Mar nero, Andriescu leg.	1	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>neritea</i> (Linné, 1758)
431,13	Cyclope	neritea		(allungata, dentellata), T. Tar Mero, Agigea e S. di Tangalia	1	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>pellucida</i> (A) + C. <i>neritea</i> (B)
431,14	Cyclope	neritea	L.	juv. (3) spiaggia Madonna D'Altomare	1	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>neritea</i> (Linné, 1758)
431,15	Cyclope	neritea	(L.)	1 juv. - Lago del Faro, magg. 1969.	1	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>neritea</i> (Linné, 1758)
431,16	Cyclope	neritea		Costa Agrigento.	1	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>neritea</i> (Linné, 1758)
431,17	Cyclope	neritea	atra Monteros.	Mar Piccolo 1025	2	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>neritea</i> (Linné, 1758)
431,18	Cyclope	neritea	atra Monts.	Lago di Ganzirri (5) V/1976	2	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>neritea</i> (Linné, 1758)
431,19	Cyclope	neritea		El Fangar. Ampolla, Tarragona. Altimira leg. (2 juv.)	2	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>neritea</i> (Linné, 1758)
431,20	Cyclope	neritea		(25) - Mar Piccolo 1025	2	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>neritea</i> (Linné, 1758)
431,21	Cyclope	neritea		(17 dett. 2 juv.) Lago di Ganzirri (Messina)	2	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>neritea</i> (Linné, 1758)
431,22	Cyclope	neritea		juv. (8) Porto Cesareo - (5) Mad. D'Altomare	2	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>pellucida</i> Risso, 1826
431,23	Cyclope	neritea		Liman Siut Ghiol (6) - Mar Nero (subfoss. ?)	2	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>neritea</i> (Linné, 1758)
431,24	Cyclope	neritea		(2) Porto Cervo, Sardegna, Servazzi don.	2	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>pellucida</i> Risso, 1826
431,25	Cyclope	neritea	(L.)	(5 e 1 juv.) Lago del Faro, V/1976	2	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>pellucida</i> Risso, 1826
431,27	Cyclope	neritea		La Strea 1969	FC	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>pellucida</i> (A) + C. <i>neritea</i> (B)
433,00	Cyclonassa	pellucida		Granitola (Sicilia) (2) Tumm. Irg. 1976	2	Cyclope (<i>Cyclope</i>) <i>pellucida</i> Risso, 1826
433,01	Cyclope	pellucida	(Risso)	? alc. caratt. giov. (apice appunt.) Porto Cesareo, prof. 20 cm (19 es.)	1	Cyclope <i>cfr</i> <i>neritea</i>

433.02	Cyclope	<i>pellucida</i>	(Risso)	Spiaaggia Torre dell'Ovo (esofica) Cataldo don. (Torre d. Greco)	1	SI	<i>Cyclope (Cyclope) pellucida</i> Risso, 1826
434.00	Cyclonassa	<i>sp.</i>			1		<i>Umbohium cfr montiferum</i>
435.00	Cyclope	<i>tarentina</i>	Par.	(1 detr.) 1016	1		<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
435.01	Cyclope	<i>tarentina</i>		Mar Piccolo	1	SI	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
435.02	Cyclope	<i>tarentina</i>	Par.	Di Stefano G. leg. (Pisa) apr. 1977	2		<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
435.03	Cyclope	<i>tarentina</i>		Otranto, L. Rugg. leg.	1		<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
436.00	Cyclope	<i>tarentina?</i>		La Strea	1		<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i> (Linné, 1758)
440.00	Cyllichna	<i>cylindracea</i>	(Penn.)	Corsica - Capraia, F. Carrozza leg. 1972	1		<i>Cyllichna crebrisculpta</i> Monterosato, 1884
440.02	Cyllichna	<i>cylindracea</i>		Catt. 9 (Baia di Risano)	1		<i>C. laevisculpta</i> (A) + <i>Cyllichna cfr crossei</i> B.D.D. 1886 (B) + <i>Retusa minutissima</i> (C)
440.04	Cyllichna	<i>cylindracea</i>	(Penn.)	juv. - Lago Cesine	2	SI	<i>Retusa truncatula</i> (Bruguère, 1792)
440.05	Cyllichna	<i>cylindracea</i>		Cattaro, 10 - 14 m - (8) ott. 1976	2		<i>Cyllichna cylindracea</i> (Pennant, 1777)
440.06	Cyllichna	<i>cylindracea</i>	(Penn.)	(6) Molfetta ag. 1977 - 1508	2		<i>Cyllichna cylindracea</i> (Pennant, 1777) (1) + <i>C. laevisculpta</i> (Granata-Grillo, 1877) (4)
444.00	Cymatium	<i>corrugatum</i>	(Lam.)	(compl. rivest.) - Porto Cesareo leg. 1974	1	SI	<i>Cymatium (Monoplex) corrugatum</i> <i>corrugatum</i> (Lamarek, 1816)
445.00	Cymatium	<i>cutaceum</i>	(L.)	Tirreno	1	SI	<i>Cabestana cutacea cutacea</i> (Linné, 1767)
446.00	Cymatium	<i>doliarium</i>		Gibilterra - Tumminello leg.	2	SI	<i>Cabestana cutacea doliarium</i> (Linné, 1767)
447.00	Cymatium	<i>parthenopaeum</i>	(von Salis)	Golfo di Taranto	1	SI	<i>Cymatium (Monoplex) parthenopaeum</i> <i>parthenopaeum</i> (Von Salis, 1793)
450.00	Cymbium	<i>papillatum</i>	Sehum. (C. olla L.)	juv. Campomarino, Dr. Giacosa leg. 1974	2	SI	<i>Luria lurida</i> (Linné, 1758)
456.01	Cypraea	<i>caputserpentis</i>		Indo - Pacifico	1	SI	<i>C. caputserpentis</i>
465.00	Cypraea	<i>lurida</i>	L.	Porto Cesareo, genn. 1967.	1	SI	<i>Luria lurida</i> (Linné, 1758)
465.01	Cypraea	<i>lurida</i>		juv. Porto Cesareo	1		<i>Luria lurida</i> (Linné, 1758)

465,02	Cypraea	<i>lurida</i>							2	SI	<i>Luria lurida</i> (Linné,1758)
470,00	Cypraea	<i>pyrum</i>	<i>bifasciata</i>	Golfo di Napoli 1950	Tirreno				1		<i>Zonaria pyrum</i> (Gmelin,1791)
470,01	Cypraea	<i>pyrum</i>	Gmel.	Arcin. Toscano, Capraia, 80 m, Frilli leg.					1	SI	<i>Zonaria pyrum</i> (Gmelin,1791)
470,04	Cypraea	<i>pyrum</i>	Gmel.	Porto Cesareo, G. Bello leg.					1	SI	<i>Zonaria pyrum</i> (Gmelin,1791)
470,05	Cypraea	<i>pyrum</i>	Gmel.	G. di Taranto					1	SI	<i>Zonaria pyrum</i> (Gmelin,1791)
476,01	Cypraea	<i>tigris</i>	(Jeffr.)	Indo - Pacifico.					1	SI	<i>Cypraea tigris</i>
479,00	Cyrbasia	<i>pulchella</i>	(Desh.)	Catt. 5 (Baia di Risano)					1	SI	<i>Cerithiopsis sp. aff. jeffreysi</i>
480,04	Cythereella	<i>albida</i>		(1) Panetta det.					2	SI	<i>M. vaauquelini</i>
480,05	Mangelia	<i>albida</i>	Desh.	Marina di Ravenna, T. Par. leg. 1957, Sett. det.					1	SI	<i>Beta nebula</i> (Montagu,1803)
480,08	Mangelia	<i>albida</i>		Cala Violina (Follonica) L. Innocenti leg. 1977					FC		<i>M. vaauquelini</i>
481,02	Cythara	<i>attenuata</i>	(Mtg.)	1016					1		<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu,1803)
481,05	Cythara	<i>attenuata</i>	(Mtg.)	n/o "Nemima"(Baia di Risano)					1		<i>Mangelia costulata</i> (Blainville,1829)
481,08	Cythara	<i>attenuata</i>	(Mtg.)	Catt. 18					1		<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu,1803)
481,09	Cythara	<i>attenuata</i>	(Mtg.)	1001					1		<i>Mangelia costata</i> (Donovan,1804)
481,11	Cythara	<i>attenuata</i>	<i>sriolata</i>	Cattaro 18					2		<i>Mangelia costulata</i> (Blainville,1829)
481,12	Cythara	<i>attenuata</i>	var. <i>payraudaezui</i>	(Panetta det.) Otranto, Merico leg.					2	SI	<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu,1803)
481,13	Cythara	<i>attenuata</i>		556					2		<i>Mangelia fieldeni</i> (Van Aartsen & Fehr de Wal,1978 ex Monterosato ms.)
481,14	Cythara	<i>attenuata</i>		299, 304					2		<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu,1803)
481,18	Cythara	<i>attenuata</i>	(Monts.)	"Titano" 1959, 500 m (1) Di Ger. det.					2		<i>Mangelia costata</i> (Donovan,1804)
481,19	Mangelia	<i>attenuata</i>		Cattaro 8 S. P. det.					3	SI	<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu,1803)
482,00	Cythara	<i>berthrandi</i>	(Payr.)	390, 561					1	SI	
482,01	Cythara	<i>berthrandi</i>		Costa Follonica, Piombino L. Innocenti legit 1977					FC	SI	<i>M. multilineolatai</i>
483,00	Cythara	<i>caerulans</i>		Fondo a Posidonia - Napoli					2	SI	<i>M. berthrandi</i>
484,01	Cythara	<i>costata</i>	(Don.)	Alghero, Sardegna, Cattani leg. 1966.					1		<i>M. berthrandi</i>
484,02	Cythara	<i>costata</i>		S. Vito, Mar Grande, Fasani leg. apr. 1974					2		<i>M. berthrandi</i>
484,03	Cythara	<i>costata</i>		La Strea					2	SI	<i>M. taeniata</i> (A) + <i>M. cfr. unifasciata</i> (B)
484,05	Cythara	<i>costata</i>	<i>coarctata</i> (Forb.)	5 (Risano)					2		<i>M. costata</i>
485,00	Cythara	<i>costulata</i>		La Strea					2	SI	<i>M. costulata</i>

486,01	<i>Cythara</i>	<i>galli</i>	(Biv.)	= companyoi B. D. D. Golfo di Taranto	1	SI	<i>M. unijasciata</i>
486,03	<i>Cythara</i>	<i>galli</i>	(Biv.)	1016	1		<i>M. taeniata</i>
486,04	<i>Cythereella</i>	<i>galli</i>	(Mts.)	1016	2	SI	<i>M. vaughelini</i>
487,00	<i>Cythara</i>	<i>indistincta</i>	(Mts.)	1010	1	SI	<i>M. costulata</i>
488,01	<i>Cythara</i>	<i>laevigata</i>	Phil.	= <i>Raphitoma zonatum</i> Loc. Costa Agrigento (5) Nat. leg.	2	SI	<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)
489,00	<i>Cythara</i>	<i>multilineoleata</i>	<i>pusilla</i> (Seacchi)	722	1		<i>M. costulata</i>
489,01	<i>Cythara</i>	<i>multilineoleata</i>		juv. Catt. 7	1		<i>Mangelia multilineolata</i> (Deshayes, 1835)
489,02	<i>Cythara</i>	<i>multilineoleata</i>		(Panetta det.) 1016	2		<i>Mangelia multilineolata</i> (Deshayes, 1835)
489,03	<i>Cythara</i>	<i>multilineoleata</i>		Monopoli 1315	2		<i>Bela brachystoma</i> (Philippi, 1844)
489,04	<i>Cythara</i>	<i>multilineoleata</i>		Molfetta 1977 - 1508	2		<i>Bela brachystoma</i> (Philippi, 1844)
489,05	<i>Cythara</i>	<i>multistriolata</i>		1314	2		<i>Mangelia multilineolata</i> (Deshayes, 1835)
489,06	<i>Cythara</i>	<i>multistriolata</i>	<i>pusilla</i>	Cala Viola (Follonica) L. Innocenti leg. 1977	FC	SI	<i>Mangelia multilineolata</i> (Deshayes, 1835)
491,00	<i>Cythara</i>	<i>rugulosa</i>	(Mts.)	Catt. 5, 24	1		<i>M. unijasciata</i> + <i>M. brusinai</i> (A)
491,01	<i>Cythara</i>	<i>rugulosa</i>	<i>derelicta</i>	(Panetta det.) Gallipoli, Fiore leg.	2		<i>M. unijasciata</i>
491,02	<i>Cythara</i>	<i>rugulosa</i>	<i>scabrida</i> (Mts.)	5,24 (Catt. e Ris.)	2		<i>M. costulata</i>
491,03	<i>Cythara</i>	<i>rugulosa</i>	<i>scabrida</i>	(11) Panetta det. 504	2	SI	<i>M. unijasciata</i>
491,04	<i>Cythara</i>	<i>rugulosa</i>	var. ?	(Panetta det.) Jesolo 8 - 9 m, 1974	2		<i>M. unijasciata</i>
491,05	<i>Cythara</i>	<i>rugulosa</i>	var. ?	(Panetta det.) 556	2		<i>M. unijasciata</i>
491,06	<i>Cythara</i>	<i>rugulosa</i>		Catt. 18	2		<i>M. unijasciata</i>
491,07	<i>Cythereella</i>	<i>rugulosa</i>	(Phil.)	(3) 193 Panetta det.	2		<i>Vedi n. 165, 02</i>
491,08	<i>Cythereella</i>	<i>rugulosa</i>	(Phil.)	(3) Panetta det. 193	2	SI	<i>M. unijasciata</i>
492,00	<i>Cythara</i>	<i>sandrii</i>		Mad. D'Altomare	2	SI	<i>M. unijasciata</i>
494,00	<i>Cythara</i>	sp.	sp.	Spiazzia Torre dell'Ovo	1		<i>M. berrandi</i> (A) + <i>Bela cf. gimmania</i> (B) + <i>Bellaspira septangularis</i> (C)
495,00	<i>Cythara</i>	sp.	sp.	721	1		<i>Mangelia unijasciata</i> (A) + <i>M. costulata</i> (B)
504,00	<i>Cythara</i>	sp.	sp.	(9) S. Vito (Taranto) apr. 1973	2		<i>M. attenuata</i> + <i>M. berrandi</i> (B) + <i>M. costulata</i> (C) + <i>B. laevigata</i> (D)
506,00	<i>Cythara</i>	sp.	sp.	Risano	2		<i>M. costulata</i> (A) + <i>Bela taprunensis</i> (B)

507,00	Cythara	sp.	S. Vito (Tar.) 1974 Fasani leg.	2	<i>Turridae</i> spp. ind.
508,00	Cythara	sp.	Cattaro 18	2	<i>M. brusinae</i> (A) + <i>M. attenuata</i> (B) + <i>M. costulata</i> (C) + <i>M. unifasciata</i> (D) + <i>B. nebula</i> (E)
510,00	Cythara	sp.	juv. La Strea, ag. 1984	3	<i>M. berrandi</i> + <i>Bela menkhorsti</i> Van Aartsen, 1988
516,01	Cythara	<i>striolata</i>	304	1	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
516,02	Cythara	<i>striolata</i>	Spiaggia Torre dell'Ovo	1	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
516,03	Cythara	<i>striolata</i>	Gajola, Napoli	1	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
516,04	Cythara	<i>striolata</i>	Adriatico	1	<i>M. sp. (unifasciata?)</i>
516,05	Cythara	<i>striolata</i>	Mad. D'Altomare, costa neretina 1968.	1	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
516,06	Cythara	<i>striolata</i>	Catt. 34	1	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
516,09	Cythara	<i>striolata</i>	Spiaggia di Eraclea (Adr.)	2	<i>Bela efr nebula</i> (Montagu, 1803)
516,10	Cythara	<i>striolata</i>	juv. Madonna D'Altomare	2	<i>M. berrandi</i>
516,11	Cythara	<i>striolata</i>	Costa di Agrigento	2	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
516,12	Cythara	<i>striolata</i>	La Strea, ag. 1984	3	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
516,13	Cythara	<i>striolata</i>	1016	FC	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
517,00	Cythara	<i>striolata ?</i>	1101	2	<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)
518,02	Cythara	<i>taeniata</i>	1016	1	<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)
518,05	Cythara	<i>taeniata</i>	Gargano 14 - 16 m 1141	2	<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu, 1803)
518,06	Cythara	<i>taeniata</i>	Mad. D'Altomare	2	<i>Mangelia taeniata</i> (Deshayes, 1835)
518,07	Cythara	<i>taeniata</i>	1001	2	<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu, 1803)
518,09	Cythara	<i>taeniata</i>	554	1	<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu, 1803)
519,00	Cythara	<i>vauquelini</i>	La Strea	2	<i>Mangelia vauquelini</i> (Payraudeau, 1826)
519,02	Cythara	<i>vauquelini</i>	193	1	<i>Mangelia vauquelini</i> (A) + <i>M. taeniata</i> (B) + <i>M. berrandi</i> (C) + <i>M. efr fieldeni</i> (D) + <i>M. unifasciata</i> (E)
519,03	Cythara	<i>vauquelini</i>	Gallipoli, Fiore leg.	1	<i>Mangelia vauquelini</i> (Payraudeau, 1826)
519,04	Cythara	<i>vauquelini</i>	Spiaggia Torre dell'Ovo	1	<i>Mangelia vauquelini</i> (A) + <i>M. taeniata</i> (B)
519,05	Cythara	<i>vauquelini</i>	398	1	<i>M. unifasciata</i>
519,07	Cythara	<i>vauquelini</i>	Spiaggia est di Torre dell'Ovo	1	<i>Mangelia vauquelini</i> (Payraudeau, 1826)

519,08	<i>Cythara</i>	<i>vauquelini</i>	Payr.	Alghero, Cattani leg. 1968.	1	<i>Mangelia vauquelini</i> (Payraudcau, 1826)
528,04	<i>Dentalium</i>	<i>dentalis</i>	L.	1016	1	<i>D. inaequicostatum</i>
532,09	<i>Dentalium</i> (<i>Fustiaria</i>)	<i>rubescens</i>	(Desh.)	Vendicari, Pachino, Sic. (10) S. Grasso det.	3	<i>Episiphon rubescens</i> (Deshayes, 1826)
532,10	<i>Dentalium</i> (<i>Fustiaria</i>)	<i>rubescens</i>	(Desh.)	Otranto, fango detritico - 35m.	FC	<i>Ditrupe</i> (Amelida): non Mollusco
539,20	<i>Dentalium</i>	<i>vulgare</i>		(12) La Strea, ag. 1984	3	<i>Antalis vulgaris</i> Da Costa, 1778
540,00	<i>Dermomurex</i>	<i>scalaroides</i>	(Bleinv.)	Capo Passero, S. Grasso leg. e det.	3	<i>Dermomurex scalaroides</i> (Blainville, 1829)
542,04	<i>Digitaria</i>	<i>digitaria</i>		SpiaGGia Marini (Ugento) 20/7/1982	3	<i>Lucinella divaricata</i> (Linné, 1758)
545,05	<i>Diodora</i>	<i>gibberula</i>	(Lam.)	La Strea, ag. 1984	3	<i>Diodora gibberula</i> (Lamarck, 1822)
546,13	<i>Diodora</i>	<i>graeca</i>		100 - 150 m Fondale a Coralligeno V/1975	FC	SI era 546,01
546,14	<i>Diodora</i>	<i>graeca</i>		2 var. (?) - Lido Silvana - prof. 4 m.	FC	SI era 546,02
547,04	<i>Diodora</i> (<i>Fissurella</i>)	<i>italica</i>	(Defr.)	La Strea, ag. 1984	3	<i>Diodora gibberula</i> (Lamarck, 1822)
550,09	<i>Diplodonta</i>	<i>apicalis</i>		304, 374	FC	<i>D. apicalis</i>
550,10	<i>Diplodonta</i>	<i>apicalis</i>		1005	FC	<i>D. apicalis</i>
552,00	<i>Diplodonta</i>	<i>orbiculata</i>		Bocche di Cattaro	1	<i>Diplodonta rotundata</i>
552,01	<i>Diplodonta</i>	<i>orbiculata</i>		Cattaro	1	<i>Diplodonta rotundata</i>
552,02	<i>Diplodonta</i>	<i>orbiculata</i>		(= D. broccchii) Cattaro	1	<i>Diplodonta rotundata</i>
554,00	<i>Diplodonta</i>	<i>semiaspera</i>	Philippi.	M.te Hermoso, Prov. B. Aires (2)	3	SI
606,00	<i>Epitonium</i>	<i>spiniferum</i>	(Seg.)	Catt. 37	1	SI
610,04	<i>Euclio</i>	<i>pyramidata</i>			FC	SI
612,00	<i>Eulima</i>	<i>compactilis</i>	Monts.	Catt. 6 (Baia di Risano)	1	SI
627,00	<i>Eulinella</i>	<i>minuta</i>	A. Ad.	(Kobelt Taf. LXXV, f. 18) 721	1	SI
645,04	<i>Fabulina</i>	<i>fabuloides</i>		La Strea, ag. 1984	3	SI
654,04	<i>Folinia</i>	<i>costata</i>	(Ad.)	SpiaGGia di Marini (Ugento) - 20/7/1982	3	SI
656,03	<i>Phasianema</i>	<i>clathratum</i>		(= Fossaurus costatus) - E. di Torre Ovo - S. P. det.	3	SI
656,04	<i>Phasianema</i>	<i>clathratum</i>	(Ph.)	Capo Passero, Sic., Santo Grasso leg. det.	3	SI

657,02	<i>Phasianema</i>	<i>costatum</i>	Brocchi	su Pheria, 150 m, Is. Gorgona, Carr. don. 1976	2	SI	<i>Clathrella clathrata</i> (Philippi, 1844)
678,10	<i>Gibberula</i>	<i>miliaria</i>		La Strea, ag. 1984	3		<i>Gibberula miliaria</i> (Linné, 1758)
678,13	<i>Gibberula</i>	<i>miliaria</i>		e <i>Gibberulina occulta</i> ? Cala Violina, Piombino Innocenti leg. 1977	FC		<i>Gibberula miliaria</i> (Linné, 1758) (11) + <i>G. Philippi</i> (Monterosato, 1878) (1)
678,14	<i>Gibberula</i>	<i>miliaria</i>		Cala Violina, Piombino Innocenti leg. 1977	FC		<i>Gibberula miliaria</i> (Linné, 1758) + <i>G. recondita</i> Monterosato, 1844
679,03	<i>Gibberula</i>	<i>philippi</i>			FC	SI	<i>Gibberula philippi</i> (Monterosato, 1878)
680,12	<i>Gibberulina</i>	<i>clandestina</i>		Cala Violina, Piombino Innocenti leg., 1977	FC	SI	<i>Granulina marginata</i> (Bivona, 1832)
681,01	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>	(Payr.)	Sig.ra Mele leg.	1		<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826) + <i>G. turbinatus</i> Juv
681,03	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>	(Payr.)	386	1		<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi, 1848)
681,04	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>		La Strea	1		<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
681,05	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>		Golfo di Taranto Sett. det.	1		<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
681,06	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>		228	1		<i>G. ardens</i>
681,07	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>	(Payr.)	Lago Ganzirri (Messina) 1969.	1		<i>Gibbula (Colliculus) adansonii sulliotti</i> Monterosato, 1888
681,08	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>	Payr.	juv. Torre dell'Ovo, Sett. det.	1	SI	<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
681,10	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>		(640) Mar Piccolo 1036	2		<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
681,12	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>	Payr.	Costa Neretina (2, su vetro)	2		<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
681,15	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>		Monopoli - S. P. det.	3		<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
681,16	<i>Gibbula</i>	<i>adansoni</i>		Porto Cesareo Schiro det.	FC		<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
682,00	<i>Gibbula</i>	<i>adriatica</i>		Chioggia	1	SI	<i>Gibbula (Colliculus) adriatica</i> (Philippi, 1844)

682.01	<i>Gibbula</i>	<i>adriatica</i>		(coll. A. Nocenti, Siracusa)	1	<i>Gibbula (Colliculus) adriatica</i> (Philippi, 1844) + <i>Littorina saxatilis</i> (1 separata)
682.02	<i>Gibbula</i>	<i>adriatica</i>		Laguna Veneta, Le Vignole giugno 1975	FC	<i>Gibbula (Colliculus) adriatica</i> (Philippi, 1844)
683.01	<i>Gibbula</i>	<i>albida</i>		(juv.) 304	1	<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826) + <i>C. jussieui</i> (2 separati)
683.02	<i>Gibbula</i>	<i>albida</i>	(Gmel.)	Ston, Adriatico or.	1	<i>Gibbula (Gibbula) albida</i> (Gmelin, 1791)
683.04	<i>Gibbula</i>	<i>albida</i>		El Fangar, Ampolla, Terragona. Alimira leg. (locotipo)	2	<i>Gibbula (Gibbula) albida</i> (Gmelin, 1791)
683.09	<i>Gibbula</i>	<i>albida</i>		Laguna Veneta, Le Vignole 6/1975 (44 + o - detr.) ombel. più o meno chiuso	2	<i>Gibbula (Gibbula) albida</i> (Gmelin, 1791)
683.10	<i>Gibbula</i>	<i>albida</i>		Laguna Veneta, Le Vignole (14, ombel. chiuso) giugno 1975	2	<i>Gibbula (Gibbula) albida</i> (Gmelin, 1791)
683.24	<i>Gibbula</i>	<i>albida</i>		(20) detr. Mar Piccolo 2° s., ag. 1983	3	<i>Gibbula (Gibbula) albida</i> (Gmelin, 1791) + <i>G. adansonii</i> (1 separata)
686.00	<i>Gibbula</i>	<i>ardens</i>		juv. S. Cataldo (Lecce, Adriatico, Sett. Det.)	1	<i>Clanculus cruciatus</i> (A) + <i>G. ardens</i> (B)
686.03	<i>Gibbula</i>	<i>ardens</i>		398	1	<i>G. ardens</i>
686.05	<i>Gibbula</i>	<i>ardens</i>		La Strea Pan. det.	1	<i>G. ardens</i>
686.06	<i>Gibbula</i>	<i>ardens</i>		721	1	<i>G. ardens</i>
686.08	<i>Gibbula</i>	<i>ardens</i>	(v. sal.)	258, 580, 193	1	<i>Gibbula (Gibbula) ardens</i> (Von Salis, 1793)
686.09	<i>Gibbula</i>	<i>ardens</i>		(7) 556	2	<i>Gibbula (Gibbula) ardens</i> (Von Salis, 1793)
686.13	<i>Gibbula</i>	<i>ardens</i>	<i>f. barbara</i>	Porto Cesareo - 6 m - 1976	3	<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
686.14	<i>Gibbula</i>	<i>ardens</i>		Porto Cesareo - 4 m	3	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi, 1848)
687.01	<i>Gibbula</i>	<i>barbara</i>	Mts.	132 171	1	<i>G. ardens</i>
688.00	<i>Gibbula</i>	<i>bisoletti</i>	Ph.	1 Sett. det.	1	<i>G. rarilineata</i>
688.01	<i>Gibbula</i>	<i>bisoletti</i>	Ph.	Catt. 39	1	<i>G. rarilineata</i>

688,02	<i>Gibbula</i>	<i>biasoletti</i>	Phil.	juv. Mar Piccolo, Sett. det.	1	SI	<i>Gibbula (Steromphala) rarilineata</i> (Michaud, 1829)
688,03	<i>Gibbula</i>	<i>biasoletti</i>	Ph.	(= nitida) (Gm.) Golfo di Taranto	1	SI	<i>Gibbula (Gibbula) ardens</i> (Von Salis, 1793)
689,00	<i>Gibbula</i>	<i>cineraria</i>		Mediterraneo (Critikian)	1	SI	<i>Gibbula (Steromphala) cineraria</i> (Linné, 1758)
691,02	<i>Gibbula</i>	<i>divaricata</i>	(L.)	1 km. ovest Torre dell'Ovo, 1972	1		<i>Gibbula (Steromphala) rarilineata</i> (Michaud, 1829)
691,03	<i>Gibbula</i>	<i>divaricata</i>	(L.) <i>marginata</i> Brus.	Is. Sahalin, Mar Nero, ott. 1969.	1		<i>Gibbula (Steromphala) divaricata</i> (Linné, 1758)
691,04	<i>Gibbula</i>	<i>divaricata</i>		61 Is. Sahalin, Mar Nero, J. Andrijescu leg.	1		<i>Gibbula (Steromphala) divaricata</i> (Linné, 1758)
691,05	<i>Gibbula</i>	<i>divaricata</i>		(8. les. e cicatr.) Mar Nero, Agigea.	1		<i>Gibbula (Steromphala) divaricata</i> (Linné, 1758)
691,06	<i>Gibbula</i>	<i>divaricata</i>	(L.)	Tirreno	1		<i>Gibbula (Steromphala) divaricata</i> (Linné, 1758) (1) + <i>Ostilinus mutabilis</i> (più grosse)
691,07	<i>Gibbula</i>	<i>divaricata</i>		Spaggia di Siponto (Adriatico)	2		<i>Gibbula (Steromphala) divaricata</i> (Linné, 1758)
691,08	<i>Gibbula</i>	<i>divaricata</i>	Bris.	(24) Porto Cesareo	2		<i>Gibbula (Steromphala) divaricata</i> (Linné, 1758)
691,09	<i>Gibbula</i>	<i>divaricata</i>	(L.)	(6) Spiaggia di Siponto (Adr.) III/1973	2	SI	<i>Gibbula (Steromphala) divaricata</i> (Linné, 1758)
691,10	<i>Gibbula</i>	<i>divaricata</i>	(L.)	Napoli, 1950	2		<i>Gibbula (Steromphala) divaricata</i> (Linné, 1758)
691,12	<i>Gibbula</i>	<i>divaricata</i>		(Nessun dato)	FC		<i>Gibbula (Steromphala) divaricata</i> (Linné, 1758)
692,00	<i>Gibbula</i>	<i>drepanensis</i>	(Brugn.)	Catt. 15, 16	1		<i>Ostilinus mutabilis</i> (Philippi, 1846)
692,01	<i>Gibbula</i>	<i>drepanensis</i>		134, 304	1	SI	<i>Gibbula (Colliculus) turbinoides</i> (Deshays, 1835)
693,01	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>		404, 564, 580, 587	1	SI	<i>Gibbula (Forskälena) fanulum</i> (Gmelin, 1791)
693,03	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>	Brus.	Catt. 5	1		<i>Gibbula (Forskälena) fanulum</i> (Gmelin, 1791) + (1) <i>G. guttadauri</i>
693,05	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>		394	1		<i>Gibbula (Forskälena) fanulum</i> (Gmelin, 1791)

693,06	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>		706	1	<i>Gibbula (Forskakelena) fanulum</i> (Gmelin,1791)
693,07	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>		1 km ovest Torre dell'Ovo, 1972	1	<i>Gibbula (Forskakelena) fanulum</i> (Gmelin,1791)
693,08	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>		398 (uno degli es. è perfetto)	1	<i>Gibbula (Forskakelena) fanulum</i> (Gmelin,1791)
693,09	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>	(Gm.)	Torre dell'Ovo (juv. fluit.)	1	<i>Gibbula (Forskakelena) fanulum</i> (Gmelin,1791)
693,10	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>		Madonna D'Altomare, gemm. 1972	2	<i>Gibbula (Forskakelena) fanulum</i> (Gmelin,1791)
693,11	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>		(4 detr.) 1318	2	<i>Gibbula (Forskakelena) fanulum</i> (Gmelin,1791)
693,13	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>		Spiaggia di Campomarino.	1	<i>Gibbula fanulum</i>
693,14	<i>Gibbula</i>	<i>fanulum</i>		582 - 586	FC	<i>Gibbula (Forskakelena) fanulum</i> (Gmelin,1791)
694,00	<i>Gibbula</i>	<i>guttadauri</i>		536	1	<i>Gibbula (Gibbula) ardens</i> (Von Salis,1793)
694,01	<i>Gibbula</i>	<i>guttadauri</i>		304	1	<i>Gibbula (Forskakelena) guttadauri</i> (Philippi,1836)
694,03	<i>Gibbula</i>	<i>guttadauri</i>		398	1	<i>Gibbula (Forskakelena) guttadauri</i> (Philippi,1836)
694,05	<i>Gibbula</i>	<i>guttadauri</i>		567	1	<i>Gibbula (Forskakelena) guttadauri</i> (Philippi,1836) + <i>G. ardens</i> (2)
694,06	<i>Gibbula</i>	<i>guttadauri</i>	(Phil.)	Bastia (Corsica) 50 - 60 m - Carozza don.	1	<i>Gibbula (Forskakelena) guttadauri</i> (Philippi,1836) + <i>G. ardens</i> (2)
694,07	<i>Gibbula</i>	<i>guttadauri</i>	(Phil.)	juv. di 1, 6 mm - 382	1	<i>Tornus subcarinatus</i> (Montagu,1803)
694,09	<i>Gibbula</i>	<i>guttadauri</i>	(Phil.)	Catt. 18	1	<i>Gibbula (Forskakelena) guttadauri</i> (Philippi,1836)
694,10	<i>Gibbula</i>	<i>guttadauroi</i>	(Phil.)	(1 detr.) prof. 48 m - 711	2	<i>Gibbula (Forskakelena) guttadauri</i> (Philippi,1836)
694,11	<i>Gibbula (Forskakalia)</i>	<i>guttadauri</i>	Phil.	juv.	1	<i>Clanculus (Clanculopsis) cruciatus</i> (Linné,1758)
694,12	<i>Gibbula (Forskakalia)</i>	<i>guttadauri</i>	Phil.	Catt. 18	FC	<i>Gibbula (Forskakelena) guttadauri</i> (Philippi,1836)
695,00	<i>Gibbula</i>	<i>leucophaea</i>		Liassa, Gerona, Gavala det., Alim. leg.	1	<i>Gibbula (Phorcus) leucophaea</i> (Philippi,1836) + <i>G. racketti</i> (2)

695.01	<i>Gibbula</i>	<i>leucophaea</i>		Catania - Priolo don.	1	SI	<i>Gibbula (Colliculus) racketti</i> (Payraudeau, 1826)
695.02	<i>Gibbula</i>	<i>leucophaea</i>	(Phil.)	(sec. chiave det. Chis. e Mel. 1972) 1102	2		<i>Gibbula (Phorcus) leucophaea</i> (Philippi, 1836)
695.04	<i>Gibbula</i>	<i>leucophaea</i>	(Phil.)	Grotta Monaca, N di Oranto, L. Ruggiero leg.	FC		<i>Gibbula (Colliculus) racketti</i> (Payraudeau, 1826)
696.00	<i>Gibbula</i>	<i>magus</i>		394	1		<i>Gibbula (Gibbula) magus</i> (Linné, 1758)
696.01	<i>Gibbula</i>	<i>magus</i>	L.	Malaga	1		<i>Gibbula (Gibbula) magus</i> (Linné, 1758)
696.03	<i>Gibbula</i>	<i>magus</i>	(L.)	Madonna D'Altomare	1		<i>Gibbula (Gibbula) magus</i> (Linné, 1758)
696.04	<i>Gibbula</i>	<i>magus</i>	L.	Golfo di Taranto 1968	2	SI	<i>Gibbula (Gibbula) magus</i> (Linné, 1758)
697.00	<i>Gibbula</i>	<i>nivosa</i>	Ad.	St. Thomas Bay - Malta, 1977. Su Posidonia. Ruggiero det.	2	SI	<i>Gibbula (Colliculus) nivosa</i> Adams A., 1851
697.03	<i>Gibbula</i>	<i>nivosa</i>	A. Ad.	1 km. ovest Torre dell'Ovo, 1972	FC		<i>Gibbula (Colliculus) adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
698.00	<i>Gibbula</i>	<i>pennanti</i>		Coll. A. Nocenti, Siracusa	1	SI	<i>Gibbula (Phorcus) philberti</i> (Récluz, 1843)
699.00	<i>Gibbula</i>	<i>philberti</i>		Sicilia (coll. Nocenti, Siracusa)	1	SI	<i>Gibbula (Phorcus) varia</i> (Linné, 1758)
699.01	<i>Gibbula</i>	<i>philberti</i>	(Récl.)	Messina - Micali leg. e det.	1		<i>Gibbula (Phorcus) philberti</i> (Récluz, 1843)
699.02	<i>Gibbula</i>	<i>philberti</i>	(Récl.)	Costa di Perzagno (Bocche di Cattaro)	1		<i>Ostilius mutabilis</i> (Philippi, 1846)
699.04	<i>Gibbula</i>	<i>philberti</i>	(Récl.)	? 573	1		<i>Gibbula (Phorcus) philberti</i> (Récluz, 1843)
699.05	<i>Gibbula</i>	<i>philberti</i>		1006 (Gibbula sp.)	FC		<i>Gibbula (Phorcus) philberti</i> (Récluz, 1843)
700.00	<i>Gibbula</i>	<i>rackettii</i>	Payr.	Mediterraneo (Criticium)	1		<i>Gibbula (Colliculus) turbinoides</i> (Deshays, 1835)
700.01	<i>Gibbula</i>	<i>rackettii</i>		Llansa, puerto Gerona, Altim. leg.	1		<i>Gibbula (Colliculus) racketti</i> (Payraudeau, 1826)
700.02	<i>Gibbula</i>	<i>racketti (= pygmaea)</i>		Porto Cesareo - S. P. det.	3		<i>Gibbula (Colliculus) racketti</i> (Payraudeau, 1826)
700.03	<i>Gibbula</i>	<i>pygmaea</i>	Risso	Stretto Messina 30 m Micali leg.	1	SI	<i>Gibbula (Colliculus) racketti</i> (Payraudeau, 1826)
700.04	<i>Gibbula</i>	<i>rackettii</i>	Payr.	(Nessun dato)	FC		<i>Gibbula (Colliculus) turbinoides</i> (Deshays, 1835)
700.05	<i>Gibbula</i>	<i>rackettii</i>		Siracusa	FC		<i>Gibbula (Colliculus) racketti</i> (Payraudeau, 1826)

714,00	<i>Gibbula</i>	sp.	Juv. (rara, punti bianchi) S. Cataldo di Lecce (Adr.)	1	<i>Gibbula (Collicultus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
715,00	<i>Gibbula</i>	sp.	Spiaggia di Campomarino, 1969.	1	<i>G. philberti</i>
717,00	<i>Gibbula</i>	sp.	Marina di S. Nicola, 40 km. da Roma, Papandrea leg.	2	<i>G. philberti</i> (3) + <i>G. racketti</i> (2) + <i>G. varia</i> (1)
718,00	<i>Gibbula</i>	sp.	foce del Chidro, (3) apr. 1968	2	<i>G. adansonii</i> (2) + <i>G. philberti</i> (1)
719,00	<i>Gibbula</i>	sp.	(6) Campomarino	2	<i>G. adansonii</i> + altre sp. (separate)
723,00	<i>Gibbula</i>	sp.	(13) Siponto (Adr.)	2	<i>G. adansonii</i> + altre sp. (separate) di cui <i>G. leucophaea</i> corrisponde alla nota su cartellino
725,00	<i>Gibbula</i>	sp.	Golfo di Gabes - Tumm. leg.	2	<i>G. ardens</i> + <i>G. turbinoides</i> + <i>Clanaculus jussieui</i>
727,00	<i>Gibbula</i>	sp.	Sicilia occidentale (3) Tumm. leg. 1975	2	<i>Gibbula (Collicultus) racketti</i> (Payraudeau, 1826)
730,00	<i>Gibbula</i>	sp.	Fondo a Cistoseira - 3 m - Porto Cesareo	3	<i>Gibbula (Collicultus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
731,00	<i>Gibbula</i>	sp.	juv. (una ventina) 1016	1	<i>Gibbula (Phorcus) leucophaea</i> (Philippi, 1836)
734,00	<i>Gibbula</i>	<i>tumida</i>	juv. Porto Cesareo, Sett. det.	1	<i>Gibbula (Collicultus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
735,00	<i>Gibbula</i>	<i>turbinoides</i>	Messina, Micali leg.	1	<i>Gibbula (Collicultus) turbinoides</i> (Deshayes, 1835)
735,01	<i>Gibbula</i>	<i>turbinoides</i>	Llansa, puerto Gerona, molto rara, Altimira leg.	1	<i>Gibbula (Collicultus) turbinoides</i> (Deshayes, 1835)
735,03	<i>Gibbula</i>	<i>turbinoides</i>	Spiaggia Mad. D'Altomare.	1	<i>Gibbula (Collicultus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)
735,04	<i>Gibbula</i>	<i>turbinoides</i>	Lago Ganzirri (6) V/1976	2	<i>Gibbula (Collicultus) adansonii sulliotti</i> Monterosato, 1888
735,05	<i>Gibbula</i>	<i>turbinoides</i>	Lago del Faro (15) V/1976	2	<i>Gibbula (Collicultus) adansonii sulliotti</i> Monterosato, 1888
736,00	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>	Malaga (Torremolinos), Gavala leg. 1950	1	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi, 1848)
736,01	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>	1019	1	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi, 1848)
736,04	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>	258	2	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi, 1848)

736,06	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>		Porto Cesareo - (varietà)	3	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi,1848) + <i>G. umbilicaris umbilicaris</i> (Linné,1758)
736,08	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>		Monopoli 1978 - S. Pal. det.	3	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris umbilicaris</i> (Linné,1758)
736,10	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>		Porto Cesareo - 3 m	3	SI <i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi,1848) + (1) <i>G. ardens</i> juv
736,11	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>	<i>doricae</i> Tap. et Can.	A. Vannelli leg., Schirò det.	3	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi,1848) + (1) <i>G. ardens</i> juv
736,13	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicata</i>		Sett. det. ? o ardens revis. STP	3	SI <i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris umbilicaris</i> (Linné,1758)
736,14	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>		<i>Gibbula</i> sp. 573	FC	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi,1848) + (1) <i>G. ardens</i> juv
736,15	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>		G. d. T.	FC	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi,1848) + (1) <i>G. ardens</i> juv
736,16	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>	var.		FC	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi,1848) + (1) <i>G. ardens</i> juv
736,17	<i>Gibbula</i>	<i>umbilicaris</i>		V. 3	FC	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris nebulosa</i> (Philippi,1848) + (1) <i>G. ardens</i> juv
737,00	<i>Gibbula</i>	<i>varia</i>	(L.)	15 - 16	1	<i>Gibbula (Colliculus) adansonii adansonii</i> (Payraudeau,1826)
737,02	<i>Gibbula</i>	<i>varia</i>	(L.)	1019	1	SI <i>Gibbula (Phorcus) varia</i> (Linné,1758)
737,04	<i>Gibbula</i>	<i>varia</i>	(L.)	Gargano 5 - 6 m. 1140	2	<i>Gibbula (Phorcus) leucophaea</i> (Philippi,1836)
742,00	<i>Glycymeris</i>	<i>glycymeris</i>		Nizza 1972.	1	SI <i>Glycymeris glycymeris</i> (Linné,1758)
742,01	<i>Glycymeris</i>	<i>glycymeris</i>		juv. 7 mm 722	1	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi,1814)
742,02	<i>Glycymeris</i>	<i>glycymeris</i>		juv. da 3, 5 a 6 mm 1016	1	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi,1814)
742,03	<i>Glycymeris</i>	<i>glycymeris</i>		juv. da 7 a 25 mm (e violascens?) 1016	1	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi,1814)
742,05	<i>Glycymeris</i>	<i>glycymeris</i>	<i>v. bavayi</i> B. D. D.	Atlantico - Kerm. - Lab. don.	1	<i>Glycymeris glycymeris</i> (Linné,1758)
743,01	<i>Glycymeris</i>	<i>pilosa</i>	(L.) v. <i>irregularis</i>	300 - Porto Cesareo.	1	<i>Glycymeris bimaculata</i> (Poli,1795)

743,04	<i>Glycymeris pilosus</i>	(preparato microsc. di peluria)	1	<i>Glycymeris bimaculata</i> (Poli,1795)
747,00	<i>Glycymeris sp.</i>	juv. 7 mm. 1140	2	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)
748,02	<i>Glycymeris violacescens</i>	Porto Cesaro	1	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)
748,03	<i>Glycymeris violacescens</i>	Settepassi det.	1	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)
748,04	<i>Glycymeris violacescens</i>	540	1	<i>Glycymeris bimaculata</i> (Poli,1795)
748,05	<i>Glycymeris violacescens</i>	Atlantico - Altim. leg.	1	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)
748,07	<i>Glycymeris violacescens</i>	(racc. vivo) 1112	2	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)
748,08	<i>Glycymeris violacescens</i>	(preparato microsc. di peluria in bals. Canada)	1	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)
748,09	<i>Glycymeris violacescens</i>	125 v. detr. spiagg. 4 - 5 km S di Zapponea, Adr.	1	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)
748,10	<i>Glycymeris violacescens</i>	juv. 9 mm 221	1	<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)
751,12	<i>Gouldia minima</i>	La Strea, ag. 1984	3	<i>Gouldia minima</i> (Montagu,1803) + (1)
757,00	<i>Haedropleura septangularis</i>	(Panetta det.) 390	2	<i>Pitar rude</i> (separata)
758,02	<i>Hallicardia ferruginea</i>	RA 2, 1969, 2500 m. (1 v. detr.)	2	
765,04	<i>Haminea navicula</i>	561, 580	1	<i>Haminea cfr. navicula</i>
768,01	<i>Helcion pellucidus</i>	Alghero	FC	2 valve di Bivalve indet., probabilmente di acqua dolce (Sphaeriidae)
769,00	<i>Helicis architae</i>	Alto Adr., 8 - 10 miglia al largo foce del Po, prof. 18 - 22 m. 1970 - G. Turolla leg.	2	<i>Pseudotorinia architae</i>
769,06	<i>Solarium architae</i>	Di Ger. det.	1	
775,01	<i>Nassa angulata</i>	Mar Piccolo - Sett. det.	1	<i>Nassarius (Hima) pygmaeus</i> (Lamarck,1822)
776,19	<i>Hinia costulata</i>	La Strea, ag. 1984	3	<i>Nassarius (Hima) incrassatus</i> (Stroem,1768)
776,20	<i>Nassa costulata</i>	Ren. var. <i>unifasciata</i> Kl.	1	<i>Nassarius cavieri</i> (Payraudeau,1826)
776,21	<i>Nassarius costulata</i>	(Ren.) v. <i>subdiaphana</i>	2	<i>Nassarius cavieri</i> (Payraudeau,1826)
776,22	<i>Nassa costulata</i>	Ren.	FC	<i>Nassarius cavieri</i> (Payraudeau,1826) + <i>Nassarius (Hima) reticulatus</i> (Linné,1758)
778,11	<i>Nassa incrassata</i>	Sedim., NE 1° s. Mar Piccolo - Sett. det.	1	<i>Nassarius (Hima) pygmaeus</i> (Lamarck,1822)

778,12	<i>Nassa</i>	<i>incrassata</i>		Sedim. citro S. Cataldo, Mar Grande 1956.	1	SI	<i>Nassarius (Hima) pygmaeus</i> (Lamarck, 1822)
781,06	<i>Nassarius</i>	<i>prismaticus</i>	(Br.)	Basso Adriatico 30 m - Taviani leg.	1	SI	<i>Nassarius (Uzita) lima</i> (Dillwin, 1817)
781,07	<i>Nassarius</i>	<i>prismaticus</i>	(Br.)	Canale di Sicilia 500 m.	FC		<i>Nassarius (Uzita) lima</i> (Dillwin, 1817)
782,02	<i>Hima</i>	<i>pygmaea</i>		Catt. 33	1	SI	<i>Nassarius pygmaeus</i>
782,04	<i>Nassa</i>	<i>pygmaea</i>	Lk.	Mar Piccolo 1956 - Sett. det.	1	SI	<i>Nassarius (Hima) pygmaeus</i> (Lamarck, 1822)
783,12	<i>Nassa</i>	<i>reticulata</i>	var. <i>modesta</i> Mil.	30 - 60 m. Mar Nero.	1		<i>Nassarius (Hima) reticulatus</i> (Linné, 1758)
783,13	<i>Nassa</i>	<i>reticulata</i>		Bocche di Cattaro.	1	SI	<i>Nassarius (Hima) reticulatus</i> (Linné, 1758)
784,00	<i>Hinia</i>	sp.		1019	1	SI	<i>Nassarius (Hima) incrassatus</i> (Stroem, 1768)
790,17	<i>Homalopoma</i>	<i>sanguineum</i>	(L.)	juv. 1,5 mm - Spiaggia Marini, 20/7/1982	3		<i>Clanculus (Clanculus) cf. corallinus</i> (Gmelin, 1791)
797,00	<i>Hydrobia (?)</i>	<i>maritima</i>	Mil.	Lago Ganzirri (bocca sup. ristretta)	1	SI	
799,00	<i>Hydrobiidae</i>	sp.		Costa Neretina. Revis. S. P. (prima err. Rissoella gl.)	3	SI	
800,00	<i>Hydrobiidae</i>	sp.		Rev. S. P. (prima err. Rissoa nitida elongata?)	3		
803,00	<i>Ischnochiton</i>	<i>rissoi</i>	(Payr.)	Ugento - Macri leg. 1981	3	SI	<i>Ischnochiton (Ischnochiton) rissoi</i> (Payraudeau, 1826)
804,01	<i>Janthina</i>	<i>bicolor</i>		Janthina sp. G. di Taranto	FC		<i>Janthina janthina</i> (Linné, 1758)
805,00	<i>Janthina</i>	<i>fragilis</i>	Lamck.	Golfo di Taranto	1	SI	
806,00	<i>Janthina</i>	<i>gracilis</i>	Lam.	Golfo di Taranto	2	SI	
815,00	<i>Jujubinus</i>	<i>montogui</i>	(Wood)	193	1	SI	
828,03	<i>Keltella</i>	<i>abyssicola</i>		G. di Taranto, coll. Panetta	FC		<i>Keltopsis jozinae</i> Van Aartsen & Carrozza, 1998
830,02	<i>Krebsia</i>	<i>intorta</i>		381 P. Parenzan leg.	FC	SI	<i>Capulus ungaricus</i>
832,15	<i>Laevicardium</i>	<i>norvegicum</i>	<i>mediterraneum</i>	Golfo di Taranto 1962	2	SI	
834,00	<i>Lajonkaira</i>	<i>lajonkairi</i>	(Payr.)	Torre Lapillo, Di Nisio leg. 1980	3	SI	<i>Petricola (Lajonkaira) lajonkairii</i> (Payraudeau, 1826)
842,00	<i>Leda</i>	<i>eleota</i>	(Adms)	S. Ant. de Las. Isletas. Prov. Buenos. Aires. G. - Z. don.	3	SI	
853,00	<i>Lepetella</i>	<i>latercompressa</i>	(Ray. et Ponz.)	528	1	SI	<i>Acmaea virginea</i>

854,00	<i>Lepidopleurus</i>	<i>algesirensis</i>	(Cappellini)	Algasiras loc. tipica, Gav. leg.	1	SI	<i>L. algesirensis</i>
856,00	<i>Leptaxinus</i>	<i>dubius</i>		Bocche di Bonifacio 100 - 150 m - Carr. Leg. 1975	2	SI	<i>Leptaxinus incrassatus</i> (Jeffreys, 1876)
857,00	<i>Leptaxinus</i>	<i>incrassatus</i>	(Jeffr.)	Tirreno - Carrozza leg.	1	SI	<i>Leptaxinus incrassatus</i> (Jeffreys, 1876)
858,01	<i>Leptaxinus</i>	<i>subovatus</i>	(Jeffr.)	RA 7, 2300 m - (2 v. attacc. Su lamina) D. G. det.	2	SI	
868,01	<i>Limatula</i>	<i>subovata</i>	(Jeffr.)	394	1	SI	<i>Limatula subovata</i> (Jeffreys, 1876)
871,00	<i>Limopsis</i>	<i>minuta</i>	(Phil.)	387	1	SI	<i>Glycymeris glycymeris</i> juv.
871,01	<i>Limopsis</i>	<i>minuta</i>		(1 v. detr.) ? 410	1	SI	
874,10	<i>Lithophaga</i>	<i>lithophaga</i>		(2) Baleari	3	SI	<i>Lithophaga lithophaga</i> (Linné, 1758)
885,00	<i>Lobiger</i>	<i>serradifalci</i>	Monts.	Mar Piccolo di Taranto, 1956.	1	SI	<i>L. serradifalci</i>
885,01	<i>Lobiger</i>	<i>serradifalci</i>	Monts.	(animale, in alcool)	1	SI	<i>L. serradifalci</i>
885,02	<i>Lobiger</i>	<i>serradifalci</i>	(Calcare)	Gallipoli, 60 m - 150	1	SI	<i>L. serradifalci</i>
887,01	<i>Loligo</i>	<i>vulgaris</i>	Lam.	(Ceñal) - gladius o calamus (conch. Comea) G. Tar.	2	SI	<i>L. vulgaris</i>
888,00	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>	<i>angulatus</i> (Mts.)?	Mare Cantabrico (Atl.)	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,01	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>	v. <i>angulata</i> Monte.	Rio Ribadeo, loc. Vegadeo, Spagna atl.	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,02	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>	var. <i>tumidus</i> (Brus.)	1 v. detr. Cattaro	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,03	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		724	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,04	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		554, 567	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,05	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		561	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,06	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		722	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,07	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		564	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,08	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		Lago Alimini (costa adriatica pugliese)	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,09	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>	(L.)	156 217	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,10	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		(detr.) Catt. 24	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,11	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		(v. partic. iridescenza) Bocche di Catt. 24	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,12	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		Spaggia S. Vito, Taranto.	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,13	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		Costa Neretina, molliss. valve - 304	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,14	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>		60 v. 1016	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,15	<i>Loripes</i>	<i>lacteus</i>	(L.)	Spaggia E. Is. Djerba (Tunisia) molte v. detr. 1974.	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>

888,16	<i>Loripes</i>	<i>laeteus</i>				Sp. Mondello, Tiz. Par. leg. 1976	2	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,17	<i>Loripes</i>	<i>laeteus</i>				Mondello (Sicilia sett.) V/1976	2	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,18	<i>Loripes</i>	<i>laeteus</i>				(1. i., 2 v. dett.) Lago del Faro 5/1976 - Giacobbe leg.	2	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,19	<i>Loripes</i>	<i>laeteus</i>				(1 v. juv. 5 mm.) Lago del Faro, V/1976	2	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
888,21	<i>Loripes</i>	<i>laeteus</i>				(dett.) Lago Ganzirri, Messina.	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
889,00	<i>Loripes</i>	<i>lucinalis</i>	(Lam.)			= <i>laeteus</i> - Lago del Faro - Messina	1	SI	<i>Loripes lucinalis</i>
890,00	<i>Loripinus</i>	<i>fragilis</i>				720	1	SI	<i>Anodontia (Loripinus) fragilis</i> (Philippi, 1836)
890,01	<i>Loripinus</i>	<i>fragilis</i>	(Phil.)			Catt. 23	1	SI	<i>Anodontia (Loripinus) fragilis</i> (Philippi, 1836)
890,02	<i>Loripinus</i>	<i>fragilis</i>	(Phil.)			1016	1	SI	<i>Anodontia (Loripinus) fragilis</i> (Philippi, 1836)
890,03	<i>Loripinus</i>	<i>fragilis</i>				564	1	SI	<i>Anodontia (Loripinus) fragilis</i> (Philippi, 1836)
890,04	<i>Loripinus</i>	<i>fragilis</i>				559, 561	1	SI	<i>Anodontia (Loripinus) fragilis</i> (Philippi, 1836)
890,06	<i>Loripinus</i>	<i>fragilis</i>	(Phil.)			77, 93, 252	1	SI	<i>Anodontia (Loripinus) fragilis</i> (Philippi, 1836)
890,07	<i>Loripinus</i>	<i>fragilis</i>				(4 v. dett.) Catt. 5	2	SI	<i>Anodontia (Loripinus) fragilis</i> (Philippi, 1836)
890,08	<i>Loripinus</i>	<i>fragilis</i>				(1 v. 5 mm) Torre dell'Ovo 40 m. Barbacovi leg.	2	SI	<i>Anodontia (Loripinus) fragilis</i> (Philippi, 1836)
894,00	(<i>Musculus</i>)					Su C'raassostrea gigas, S'rea fondo detrítico	FC		<i>Modiolarea subpicta</i> (Cantraine, 1835)
899,03	<i>Lunatia</i>	<i>guillemini</i>	(L.)			710	FC	SI	<i>Euspira guillemini</i>
907,01	<i>Lutreria</i>	<i>lutreria</i>	(L.)			Mare del Nord - Kermarr. - Labisse don.	1	SI	
911,00	<i>Macoma</i>	<i>balthica</i>	(L.)			Mare del Nord. Binnekamp leg., Leiden.	1		<i>Macoma (Macoma) balthica</i> (Linné, 1767)
911,01	<i>Macoma</i>	<i>balthica</i>	(L.)			(11 int. rosse) Mare del Nord	1		<i>Macoma (Macoma) balthica</i> (Linné, 1767)
911,03	<i>Macoma</i>	<i>balthica</i>	(L.)			(col. giallino), Olanda - Binnekamp leg.	1		<i>Macoma (Macoma) balthica</i> (Linné, 1767)
911,04	<i>Macoma</i>	<i>balthica</i>	(L.)				1		<i>Macoma (Macoma) balthica</i> (Linné, 1767)

911,05	<i>Macoma</i>	<i>balthica</i>	(L.)	Olanda	1	<i>Macoma (Macoma) balthica</i> (Linné,1767)
913,05	<i>Maetra</i>	<i>corallina</i>	<i>stultorum</i>	Margher. di Savoia (Manfredonia, Adr.)	1	<i>Maetra stultorum</i> (Linné,1758)
913,06	<i>Maetra</i>	<i>corallina</i>	<i>stultorum</i>	(v. con anomalia) sp. S di Crotone 1969,	1	<i>Maetra stultorum</i> (Linné,1758)
913,07	<i>Maetra</i>	<i>corallina</i>	<i>stultorum</i>	sud di Zapponea, Puglia, Adriatico 1973,	1	<i>Maetra stultorum</i> (Linné,1758)
913,08	<i>Maetra</i>	<i>corallina</i>	<i>stultorum</i>	(10 v.) spiaggia di Gabès (Tunisia), 97-4m	1	<i>Maetra stultorum</i> (Linné,1758)
913,15	<i>Maetra</i>	<i>corallina</i>	<i>stultorum</i>	Sud di Zapponea, Puglia, Adriatico 1973.	1	<i>Maetra stultorum</i> (Linné,1758)
913,16	<i>Maetra</i>	<i>corallina</i>	<i>stultorum</i>	(46 v.) Barletta, 27/2/1973	2	<i>Maetra stultorum</i> (Linné,1758)
913,17	<i>Maetra</i>	<i>corallina</i>	<i>stultorum</i>	(6 v. anormale) Barletta 1973	2	<i>Maetra cf. glauca</i> Von Bom,1778
913,18	<i>Maetra</i>	<i>corallina</i>	<i>stultorum</i>	juv. (55 int.) Barletta	2	<i>Maetra stultorum</i> (Linné,1758)
920,07	<i>Mantellium</i>	<i>hians</i>	(Gm.)	La Strea, ag. 1984	3	<i>Lima (Limaria) tuberculata</i> (Olivi,1792)
925,02	<i>Melanoides</i>	<i>tuberculata</i>		Lago Tiberiade (11) apr. 77, Parenzan leg.	2	<i>Melanoides cf. tuberculata</i>
938,06	<i>Mitra</i>	<i>cornicula</i>	(L.)	La Strea, ag. 1984	3	<i>Mitra cornicula</i> (Linné,1758)
942,02	<i>Mitra</i>	<i>zonata</i>	Marr.	Porto Cesareo.	1	<i>Mitra zonata</i> Marryat,1818
942,04	<i>Mitra</i>	<i>zonata</i>		(5 lesionati) Porto Cesareo.	1	<i>Mitra zonata</i> Marryat,1818
942,05	<i>Mitra</i>	<i>zonata</i>		(3 les. e detr. nr. 9, 19, 23).	1	<i>Mitra zonata</i> Marryat,1818
942,09	<i>Mitra</i>	<i>zonata</i>		Porto Cesareo 70 m. Esempari già registrati nel I° Catalogo, con indicazioni incomplete: 2 racc. vivi, nr. 9, 19, 23 (e 1 detr.); 2 es. racc. vivi; 2 detriti; f. incurvata (2 racc. vive - Adriatico - Ancona)	2	<i>Mitra zonata</i> Marryat,1818
950,16	<i>Mitrella</i>	<i>scripta</i>		La Strea, ag. 1984	3	<i>Mitrella scripta</i> (Linné,1758)
956,00	<i>Modiolus</i>	<i>barbata</i>		juv. 9 - 22 mm 377	1	<i>Modiolus (Gibbomodiola) adriaticus</i> (Lamarek,1819)
959,00	<i>Modiolus</i>	<i>adriaticus</i>	(Lamk.)	Mare Cantabrico.	1	<i>Modiolus (Gibbomodiola) adriaticus</i> (Lamarek,1819)
959,03	<i>Modiolus</i>	<i>adriaticus</i>		567	1	

959,04	<i>Modiolus</i>	<i>adriaticus</i>		398	1	<i>Modiolus (Gibbomodiolus) adriaticus</i> (Lamarek, 1819)
961,00	<i>Modiolus</i>	<i>barbatus</i>	L.	juv. 567	1	<i>Modiolus (Gibbomodiolus) adriaticus</i> (Lamarek, 1819)
961,01	<i>Modiolus</i>	<i>barbatus</i>	<i>dilatatus</i> (Phil.)	Mola di Bari.	1	<i>Modiolus (Modiolus) barbatus</i> (Linné, 1758)
961,04	<i>Modiolus</i>	<i>barbatus</i>		Menorca Altim. leg.	1	<i>Modiolus (Modiolus) barbatus</i> (Linné, 1758)
961,09	<i>Modiolus</i>	<i>barbatus</i>		(anomalo, più globoso) - Punta Rondinella (Tar.)	1	<i>Modiolus (Modiolus) barbatus</i> (Linné, 1758)
961,10	<i>Modiolus</i>	<i>barbatus</i>	(L.)	S. Vito (Taranto) apr. 1973.	1	<i>Modiolus (Modiolus) barbatus</i> (Linné, 1758)
961,11	<i>Modiolus</i>	<i>barbatus</i>		(ad. e juv. 5 mm) 221	1	<i>Modiolus (Modiolus) barbatus</i> (Linné, 1758)
961,13	<i>Modiolus</i>	<i>barbatus</i>	<i>dilatatus</i> (Phil.)	su Chl. Varia - Largo f. Piave 13 m	2	<i>Modiolus (Modiolus) barbatus</i> (Linné, 1758)
961,15	<i>Modiolus</i>	<i>barbatus</i>	<i>elongatus</i>	(1 v. dett. di 54 mm) Mar Piccolo 1025	2	<i>Modiolus (Modiolus) barbatus</i> (Linné, 1758)
961,19	<i>Modiolus</i>	<i>barbatus</i>		(dett.) La Strea, ag. 1984	3	<i>Modiolus (Modiolus) barbatus</i> (Linné, 1758)
962,00	<i>Modiolus</i>	<i>politus</i>	(Verrill e Smith)	Fondo fangoso, oltre 500 m, ONO di Marettimo, Sicilia, Bombace leg. 1957.	1	<i>M. politus</i>
963,00	<i>Monia</i>	<i>cladocorae</i>	Parenzan	OLOTIPO Bocche di Cattaro.	1	<i>Pododesmus (monia) patelliformis</i> (Linné, 1758)
964,00	<i>Monia</i>	<i>glauca</i>	(Monis.)	1 fr. subfoss. Basso Adriatico	1	<i>Pododesmus (monia) patelliformis</i> (Linné, 1758)
965,00	<i>Monia</i>	<i>ornata</i>	(Loc.)	dett. 86	1	<i>Pododesmus (monia) patelliformis</i> (Linné, 1758)
966,06	<i>Monia</i>	<i>patelliformis</i>	(L.)	Cattaro 6, 23	1	<i>Pododesmus (monia) patelliformis</i> (Linné, 1758)
969,01	<i>Monia</i>	<i>squama</i>		Prof. 150 m -411	2	<i>Pododesmus (monia) patelliformis</i> (Linné, 1758)
970,00	<i>Monodonta</i>	<i>articulata</i>		(2) Poesia Piccola (Puglia)	3	<i>Osilinus articulatus</i> Lamarek, 1822
970,02	<i>Monodonta</i>	<i>articulata</i>	Lamarek	Golfo di Taranto.	1	<i>Osilinus articulatus</i> Lamarek, 1822
970,03	<i>Monodonta</i>	<i>articulata</i>	Lamark.	14 sedim. rec. bac. cost. Porto Cesareo.	1	<i>Osilinus articulatus</i> Lamarek, 1822

970,05	Monodontia	articulata	Lamck.	Insenat. or. Is. S. Pietro, inquinata, profund. 0 - 0, 10 m. (17 esemplari con opercoli) luglio 1975	2	<i>Osilinus articulatus</i> Lamareck, 1822 + <i>Osilinus turbinatus</i> (Von Born, 1778)
970,06	Monodontia	articulata	Lamck.	(3) Napoli, 1952	2	<i>Osilinus articulatus</i> Lamareck, 1822
970,07	Monodontia	articulata	Lamck.	Sicilia occid. Tuminello leg.	2	<i>Osilinus articulatus</i> Lamareck, 1822
971,00	Monodontia	atrata	trapez NordS.	Playa aeropuerto Las Palmas, Gran Canaria 1969, S. Palazzi don. 1978	3	SI <i>Osilinus atratus</i>
973,02	Monodontia	mutabilis	(Phil.)	Catt. 8 (?)	1	SI <i>Osilinus</i> cf. <i>mutabilis</i> (Philippi, 1846)
974,03	Monodontia	turbinata	(Bom)	Fuengirola Spagna Atl. Mald. Quil. leg.	1	SI <i>Osilinus turbinatus</i> (Von Born, 1778)
974,06	Monodontia	turbinata	(Bom)	Tirreno.	1	<i>Osilinus turbinatus</i> (Von Born, 1778)
974,07	Monodontia	turbinata	(Bom)	gr. es. 36 mm, det. (subfoss?) sp. Tirreno.	1	<i>Osilinus turbinatus</i> (Von Born, 1778)
974,10	Monodontia	turbinata	(Bom)	(10) Lago del Faro (Messina) 1969	2	<i>Osilinus articulatus</i> Lamareck, 1822
974,11	Monodontia	turbinata	(Bom)	Sicilia occ. - Tuminello leg.	2	<i>Osilinus turbinatus</i> (Von Born, 1778)
975,00	Murex	blainvillei	Payr.	(var. senza spine) loc. Seij - Dalmazia, Carozza leg.	1	<i>Muricopsis</i> cf. <i>inermis</i> (Philippi, 1836)
975,01	Murex	blainvillei	Payr.	Mar Piccolo - Sett. det.	1	<i>Muricopsis cristata</i> (Brocchi, 1814)
975,02	Murex	blainvillei		Cattaro	2	<i>Muricopsis cristata</i> (Brocchi, 1814)
975,03	Murex	blainvillei		Cattaro	2	SI
976,00	Murex	brandaris		<i>aculeatus</i> con. - <i>aspinosus</i> Sett.	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné, 1758)
976,04	Murex	brandaris		(14) largo f. Piave, 1974.	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné, 1758)
976,05	Murex	brandaris		720	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné, 1758)
976,06	Murex	brandaris		longispinosus	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné, 1758)
976,07	Murex	brandaris		longispinosus Coen	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné, 1758)
976,09	Murex	brandaris		monstr. bicaudata	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné, 1758)
976,10	Murex	brandaris		<i>L. polii</i> (Monts.) <i>canali aspinosus</i> Sett.	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné, 1758)
				al largo di Campomarino, prof. 55 m - Paolo Martina leg. 1965	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné, 1758)
				Sedin. NE 1° s. Mar Piccolo (subfoss?)	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné, 1758)
				<i>robustus</i> Dautz.		

976,13	Murex	<i>brandaris</i>	L.	juv. 9 e 14 mm - 1016	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,14	Murex	<i>brandaris</i>	L.	1016	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,19	Murex	<i>brandaris</i>		Malaga - Maldon. leg.	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,22	Murex	<i>brandaris</i>	<i>L. longispinosus</i> Coen	Bocche di Cattaro.	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,23	Murex	<i>brandaris</i>		8 largo foce Piave, 13 m - sett. 1974.	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,24	Murex	<i>brandaris</i>		juv. - 10 largo foce Piave, 13 m - sett. 1974.	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,28	Murex	<i>brandaris</i>	<i>acul. canali - aspin.</i> Sett.	(?: uno con apice rostro rigon. normalmente, uno con ap. ro. rig. biforc.) - Largo foce Piave 13 m	2	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,30	Murex	<i>brandaris</i>	<i>bucculentus- aculeatus-dissomus</i>	(Atlante 1967, Tav. 5, fig. 19 - Esempi. dett. - Mar Piccolo di Tar. - 1032	2	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,33	Murex	<i>brandaris</i>	<i>f. monocoronata</i>	n. f. - prof. 80 m - (anim. conts. alcool) 393	2	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,37	Murex	<i>brandaris</i>		var. Spiaggia a sett. di Barletta (9)	2	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,45	Murex	<i>brandaris</i>		(10 juv. 15 - 20 mm.) Gargano 10 m - 1159	2	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,50	Murex	<i>brandaris</i>		n. f. prof. 150 m (in alcool) 411	2	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,52	Murex	<i>brandaris</i>	<i>aculeatus canali - aspinosus</i> Sett.	La Strea, 1984	3	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,53	Murex	<i>brandaris</i>	<i>esilispinosa</i>	La Strea, ag. 1984	3	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,56	Murex	<i>brandaris</i>		(dett.) La Strea, ag. 1984	3	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,58	Murex	<i>brandaris</i>	<i>fragilis</i> Coen	1016	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
976,59	Murex	<i>brandaris</i>	<i>longispinosus</i> Coen	Bocche di Cattaro.	1	<i>Bolinus brandaris</i> (Linné,1758)
979,00	Murex	<i>erinaceus</i>	<i>var. tarenitimus</i> (L.)	Mar Grande di Taranto.	1	<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linné,1758)
979,05	Murex	<i>erinaceus</i>		Tirreno 1948	2	<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linné,1758)
984,01	Murex	<i>trunculus</i>	L.	Golfo di Taranto.	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,03	Murex	<i>trunculus</i>	<i>f. elongata</i>	Catt. I	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,04	Murex	<i>trunculus</i>	<i>f. portulana</i>	84 - 85	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,05	Murex	<i>trunculus</i>	<i>minor</i>	1016	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)

984,06	Murex	<i>trunculus</i>	<i>minor - depressus</i> Sett.	Versilia, Sesti leg.	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,14	Murex	<i>trunculus</i>	var. <i>portulana</i> Mts.	juv. Mar Grande di Taranto.	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,20	Murex	<i>trunculus</i>		(con Chama) 547	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,22	Murex	<i>trunculus</i>	<i>L. hirta - spinosus</i> Monts.	Catt. 1	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,23	Murex	<i>trunculus</i>	<i>L.</i>	Catt. 1	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,24	Murex	<i>trunculus</i>	<i>L. bulo</i> Coen	Catt. 33	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,28	Murex	<i>trunculus</i>		juv. La Strea 28 dic. 1969 - Panetta det.	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,30	Murex	<i>trunculus</i>	<i>portulanus</i>	juv. - Lago del Faro V/1976	2	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,31	Murex	<i>trunculus</i>	<i>L. turritanus</i> <i>fasciatus</i> Req.	Golfo Napoli, 1975	2	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,35	Murex	<i>trunculus</i>	<i>turritanus</i> Segre, <i>elongatus</i> Sett.	Golfo Napoli 1954	2	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,38	Murex	<i>trunculus</i>		di 11 cm - Porto Cesareo 1968	2	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,55	Trunculariopsis	<i>trunculus</i>	(<i>L.</i>)	Cattaro	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,62	Trunculariopsis	<i>trunculus</i>	<i>spinosus</i> Phil.	La Strea, ag. 1984	3	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,65	Murex	<i>trunculus</i>		fra il messapianus Sett. (costa jonica, Porto Cesareo, Gallipoli, Ugento, Castro) e il turritanus <i>elongatus</i> Sett. (detr., 96 mm). Porto Cesareo 1976 - prof. 35 m.	FC	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,66	Murex	<i>trunculus</i>	<i>robustus</i>	Versilia, Sesti leg.	FC	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
984,67	Murex	<i>trunculus</i>	<i>fasciatus</i>	Versilia, Sesti leg.	FC	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
987,00	Muricopsis	<i>aradasii</i>	Monteros.	= M. diadema. Capo Passero (7) . S. Grasso leg	3	<i>Murexul aradasii</i> (Poirier,1883 ex Monterosato ms.)
988,02	Muricopsis	<i>crisatus</i>	(Brocchi)	1001	1	<i>Muricopsis inermis</i> (Philippi,1836)
988,06	Muricopsis	<i>crisatus</i>	(Brocchi)	in Cladocora - Boecche di Cattaro.	1	<i>Muricopsis cristata</i> (Brocchi,1814)
988,07	Muricopsis	<i>crisatus</i>	(Brocchi)	398	1	<i>Muricopsis cristata</i> (Brocchi,1814)
988,09	Muricopsis	<i>crisatus</i>		Monopoli - (8) 1318	2	<i>Muricopsis inermis</i> (Philippi,1836)
989,03	Muricopsis	<i>inermis</i>		juv. 6 mm. Spiaggia Torre dell'Ovo.	1	<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné,1758)
991,00	Musculus	<i>discors</i>		(?) 564	1	<i>Modiolarea subpieta</i> (Cantraine,1835)
991,01	Musculus	<i>discors</i>	(<i>L.</i>)	19	1	<i>Modiolarea subpieta</i> (Cantraine,1835)

	<i>Musculus</i>	<i>marmoratus</i>		Siracusa. Collezione di Anna Noceni.	FC	<i>Modiolarca subpieta</i> (Cantraine, 1835)
992,07	<i>Nassa</i>	<i>asperula</i>	Br.	Mar Grande di Taranto. Sett. det.	1	<i>Nassarius (Hima) reticulatus</i> (Linné, 1758)
1020,00	<i>Nassa</i>	<i>mutabilis</i>		juv. 5,5 mm - Punta Negra (Alghero).	1	<i>Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis</i> (Linné, 1758)
1023,00	<i>Nassa</i>	<i>nitida</i>		(Hima retic. mamillata Risso) Sedimento NE 1° s. Mar Piccolo.	1	<i>Nassarius (Hima) reticulatus</i> (Linné, 1758)
1023,01	<i>Nassa</i>	<i>nitida</i>		juv. Mar Piccolo 1956 - Sett. det.	1	<i>Nassarius (Hima) pygmaeus</i> (Lamarck, 1822) juv.
1024,00	<i>Nassarius</i>	<i>tiarula</i>	(Kiener)	Alicia Playa - San Felipe - Messico.	1	<i>Specie di Nassariidae</i> inclassific.
1025,00	<i>Nassarius</i>	<i>turulosus</i>	(Risso)	= semistriatus AA. Sicilia, S. Grasso leg.	3	<i>Nassarius (Nassarius) turulosus</i> (Risso, 1826)
1026,00	<i>Nassarius</i>	<i>vibex</i>	(Say)	Brasile (Coll. Jorge Vaz) Dell'Angelo don.	1	<i>Specie di Nassariidae</i> inclassific.
1027,00	<i>Natica</i>	<i>alderi</i>		Catt. 45	1	NC
1028,00	<i>Natica</i>	<i>dilwynii</i>	Payr.	Spiaggia Campomarino 1969 - Panetta det.	1	<i>Natica (Natica) dilwynii</i> (Payraudeau, 1826)
1029,00	<i>Natica</i>	<i>guillemini</i>	Payr.	(3) Sedim. NE Mar Piccolo	2	<i>Euspira guillemini</i> (Payraudeau, 1826)
1030,00	<i>Natica</i>	<i>hebraea</i>		(grandi esemplari) Porto Cesareo.	1	<i>Natica (Naticarius) hebraea</i> (Martyn, 1784)
1030,01	<i>Natica</i>	<i>hebraea</i>		Golfo di Napoli 1950 (3)	2	<i>Natica (Naticarius) hebraea</i> (Martyn, 1784)
1030,02	<i>Natica</i>	<i>hebraea</i>		(3 grandi es.) Golfo di Taranto 1970	2	<i>Natica (Naticarius) hebraea</i> (Martyn, 1784)
1030,03	<i>Naticarius</i>	<i>hebraeus</i>	(Mart.)	Spiaggia S. Vito (Taranto) 3 apr. 1973	2	<i>Natica (Naticarius) hebraea</i> (Martyn, 1784)
1031,00	<i>Natica</i>	<i>intricata</i>	Don.	Sedim. NE 1° s. Mar Piccolo, Sett. det.	1	<i>Euspira pulchella</i> (Risso, 1826) (in prevalenza, ma il materiale è eterogeneo)
1031,01	<i>Natica</i>	<i>intricata</i>		juv. (5) - Marina di Ravenna, Tullio Parenzan leg. 1957	2	Varie specie di <i>Nassariidae</i> juv. Tra cui anche <i>Cyclope</i>
1032,01	<i>Natica</i>	<i>pulchella</i>	Risso	Porto Cesareo	FC	<i>Euspira</i> cf. <i>pulchella</i> (Risso, 1826)

1033,00	<i>Natica sanguinolenta</i>	Brus.	(Nat. millepunct. sanguin.?) (v. camp. unico Mus. Zagabria; kobelt Taf. L.I, n. 6 e 7). Golfo di Taranto, dalla vecchia collez. senza indicazione precisa di località.	1	SI	<i>Tectonatica flammulata</i>
1034,00	<i>Natica</i> sp.		fossile (rade macule) costa Brindisi.	1		<i>Natica tigrina</i> (fossile)
1035,00	<i>Naticarius dilhwyni</i>	(Payr.)	Porto Cesareo - Barbacovi leg.	2		<i>Natica (Natica) dilhwynii</i> (Payraudeau, 1826)
1035,01	<i>Naticarius dilhwyni</i>	(Payr.)	Catt. 1	1		<i>Euspira putchella</i> (Risso, 1826)
1035,02	<i>Naticarius dilhwyni</i>	(Payr.)	Costa Neretina	1		<i>Natica (Natica) dilhwynii</i> (Payraudeau, 1826)
1035,03	<i>Naticarius dilhwyni</i>	(Payr.)	Bastia (Corsica) Carrozza leg.	1	SI	<i>Euspira putchella</i> (Risso, 1826)
1035,04	<i>Naticarius dilhwyni</i>	(Payr.)	Porto Cesareo (2)	2		<i>Natica (Natica) dilhwynii</i> (Payraudeau, 1826)
1035,05	<i>Naticarius dilhwyni</i>	(Payr.)	Porto Cesareo 1966	2		<i>Natica (Natica) dilhwynii</i> (Payraudeau, 1826)
1036,00	<i>Natica millepunctata</i>	(Lam.)	RA 1969, St. 10, 500 m. (1 detr.) D. G. det.	2		<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)
1036,02	<i>Naticarius millepunctatus</i>	(Lameck.)	juv. 241	1		<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)
1036,03	<i>Naticarius millepunctatus</i>		561	1		<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)
1036,04	<i>Naticarius millepunctatus</i>	(Lam.)	Golfo di Taranto.	1		<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)
1036,05	<i>Naticarius millepunctatus</i>	(Lameck.)	2 es. gr. (50 mm) Adriatico.	1	SI	<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)
1036,06	<i>Naticarius millepunctatus</i>	(Lameck.)	Spaggiata Siponto (Adr.) 1975	2		<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)
1036,07	<i>Naticarius millepunctatus</i>	(Lameck.)	juv. Lesina 1106	2		<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)
1036,08	<i>Naticarius millepunctatus</i>		juv. 6 - 7 mm. - 1117	2		<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)
1036,09	<i>Naticarius millepunctatus</i>	(Lameck.)	juv. 7 mm. - Gargano 16 m. - 1170	2		<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)

1036,11	<i>Naticarius</i>	<i>millepunctatus</i>							<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin,1791)
1037,00	<i>Naticidae</i>	sp.			juv. 4 mm. La Strea, ag. 1984	3	SI		
1038,00	<i>Naticidae</i>	sp.			? juv. 2 mm. - 1106 (detr.) Margellina (Napoli)	2			<i>Naticidae</i> juv. <i>indet.</i> <i>Euspira guillemini</i> (Payraudeau,1826) + <i>Euspira macilenta</i> (Philippi,1844)
1039,00	<i>Naticidae</i>	sp.			juv. 3 mm Largo focc Piave 13 m. 1974	2			<i>Euspira</i> cf. <i>guillemini</i> (Payraudeau,1826)
1041,00	<i>Nyctopsis</i>	<i>granum</i>			Castelldefels, Barcelona 17/9/72. Altim, leg.	1	SI		<i>Nassarius granum</i>
1050,18	<i>Neverita</i>	<i>josephina</i>			(3) - Spiaggia Chiatona, De Falco Iwg. 1983	3	SI		<i>Neverita josephina</i> Risso, 1826
1053,00	<i>Nodulus</i>	<i>contortus</i>			Lo Scoglione, Posillipo (Na) - 0, 10 - S. P. don.	3	SI		
1058,12	<i>Nucula</i>	<i>nucleus</i>		(L.)	La Strea, ag. 1984	3	SI		<i>Nucula hanleyi</i> Winckworth,1931
1064,13	<i>Nucula</i>	<i>sulcata</i>			1837, juv 5 mm	FC			<i>Nucula sulcata</i> Bronn,1831
1069,12	<i>Nuculana</i>	<i>fragilis</i>		(Chemn.)	Marzamemi, Sic. (3), S. Grasso don.	3	SI		<i>Nuculana (Jupiteria) commutata</i> (Philippi,1844)
1072,02	<i>Ocenebra</i>	<i>distinctus</i>		(De Crist. et Jan.)	La Strea, dic. 1969	3	SI		<i>Ocenebrina edwardsii</i> (Payraudeau,1826)
1073,00	<i>Ocenebra</i>	<i>erinaceus</i>		<i>cinguliferus</i> Lamk.	costa Agrigento, F. Nativo leg. 1974	1			<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linné, 1758)
1073,01	<i>Ocenebra</i>	<i>erinaceus</i>		<i>tarentina</i> Lam.	(uguale a Murex tarentinus)	1			<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linné, 1758)
1073,02	<i>Ocenebra</i>	<i>erinaceus</i>		(L.)	Ston (Dalmazia) ag. 1972.	1			<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linné, 1758)
1073,03	<i>Ocenebra</i>	<i>erinaceus</i>			(var. a labbro sottile, int. solc.) costa Agrigento, Nat. leg.	1			<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linné, 1758)
1073,06	<i>Ocenebra</i>	<i>erinaceus</i>		<i>tarentinus</i> Lamck.	Spiaggia Siponto (Adr.) V. Settepassi, Atlante Malacologico, I vol. 1967, T. 38, n. 104 C	2			<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linné, 1758)
1073,07	<i>Ocenebra</i>	<i>erinaceus</i>		(L.)	Spiaggia Siponto (Adr.) (detr.)	2			<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linné, 1758)
1076,02	<i>Ocenebrina</i>	<i>edwardsi</i>		(Payr.)	La Strea - Porto Cesareo.	1			<i>Ocenebrina edwardsii</i> (Payraudeau,1826) (forse qualche juv eroso di altra speie frammisto)
1076,03	<i>Ocenebrina</i>	<i>edwardsi</i>			(6) - Porto Cesareo	3			<i>Muricopsis inermis</i> (Philippi,1836) (4) + <i>Engina leucozona</i> (Philippi,1843) (2)

1076,06	<i>Ocinebrina</i>	<i>edwardsii</i>	<i>helleriana</i> (Brusina)	566	1	<i>Ocinebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)
1076,07	<i>Ocinebrina</i>	<i>edwardsii</i>	<i>helleriana</i> (Brus.)	Catt. 43	1	<i>Ocinebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)
1076,08	<i>Ocinebrina</i>	<i>edwardsii</i>	(Payr.)	214	1	<i>Ocinebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)
1076,09	<i>Ocinebrina</i>	<i>edwardsii</i>	(Payr.)	1008	1	<i>Ocinebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)
1076,10	<i>Ocinebrina</i>	<i>edwardsii</i>	(Payr.)	566	1	<i>Ocinebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)
1076,11	<i>Ocinebrina</i>	<i>edwardsii</i>	(Payr.)	La Strea	FC	<i>Ocinebrina edwardsii</i> (Payraudeau, 1826)
1077,00	<i>Ocinebrina</i>	<i>aciculata</i>		84, 85, 114, 176	1	Varie specie di <i>Muricidae sens. lat.</i> Fluitate
1077,01	<i>Ocinebrina</i>	<i>aciculata</i>		504	1	<i>Raphitoma linearis</i> (Montagu, 1803)
1077,04	<i>Ocinebrina</i>	<i>aciculata</i>		Fondo a Posidonia, Adriat. - A. Simunovic leg.	3	<i>Ocinebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)
1077,05	<i>Ocinebrina</i>	<i>aciculata</i>		Golfo di Gabes (Tunisia)	3	<i>Ocinebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)
1077,06	<i>Ocinebrina</i>	<i>aciculata</i>		35 m - Secche di Ugento 1977. 1610	3	<i>Ocinebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)
1077,08	<i>Ocinebrina</i>	<i>aciculata</i>	(Lam.)	585-586	FC	<i>Ocinebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)
1078,00	<i>Ocinebrina</i>	sp.		? Spiaggia della Strea (alc. centinata) m 28 dic. 1969	3	Varie specie di vari generi mischiate assieme (<i>Ocinebrina</i> , <i>Muricopsis</i> , <i>Engina</i>)
1081,00	<i>Odostomia</i>	<i>conoidea</i>		Catt. 9 (Baia di Risano)	1	<i>Odostomia (Megastomia) conoidea</i> (Brocchi, 1814)
1081,01	<i>Odostomia</i>	<i>conoidea</i>	(Brocchi)	Catt. 5 43	1	A: <i>Odostomia (Megastomia) cfr conoidea</i> (Brocchi, 1814). B: <i>O. (M.) conspicua</i> Alder, 1850
1082,00	<i>Odostomia</i>	<i>plicata</i>	Montagu	Anello di S. Cataldo, Taranto, Sett. det.	1	<i>O. (M.) conspicua</i> Alder, 1850
1083,02	<i>Odostomia?</i>	<i>rissoides</i>	Hanley	(var?) Mar Piccolo di Taranto, 1961.	1	Vari Hydrobiidae + <i>O. striolata</i> (1) + <i>Peringiella cfr. denticulata</i> (1)
1084,00	<i>Odostomia</i>	sp.		S. P. det. - Molfetta - 1514	3	<i>Odostomia (Odostomia) scalaris</i> Mac Gillivray, 1843
1085,00	<i>Odostomia</i>	<i>turriculata</i>	Monts.	193	1	<i>Odostomia (Megastomia) conoidea</i> (Brocchi, 1814)
1085,01	<i>Odostomia</i>	<i>turriculata</i>	Monts.	Brindisi	1	<i>O. (M.) cfr conspicua</i> Alder, 1850
1085,03	<i>Odostomia</i>	<i>turriculata</i>	Monts.	Mar Piccolo di Taranto.	1	<i>O. (M.) conspicua</i> Alder, 1850
1085,04	<i>Odostomia</i>	<i>turriculata</i>	Monts.	1001	1	<i>O. (M.) conspicua</i> Alder, 1851

1086,00	<i>Odostomia</i>	<i>unidentata</i>	Desm.	juv. Sedim. citro S. Cataldo, Mar Grande Tar.	1	SI	<i>O. (M.) cf. conspicua</i> Alder, 1850
1105,00	<i>Ostrea</i>	<i>adriatica</i>	Lamck.	su Cerith, vulg. 562 (Mare inquinato.)	1		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1105,01	<i>Ostrea</i>	<i>adriatica</i>	Lamck.	"La Strea" Porto Cesareo 1968.	1		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1105,04	<i>Ostrea</i>	<i>adriatica</i>		Jesolo 2 - 3 m - 1974.	1		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1105,06	<i>Ostrea</i>	<i>adriatica</i>		juv. su Cerithium vulg. - Spiaggia S. Vito (Ta), 1973	2		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1105,07	<i>Ostrea</i>	<i>adriatica</i>		(detr.) su fr. Murex, con Petaloconchus int. - Mar Piccolo 1036	2		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1105,08	<i>Ostrea</i>	<i>adriatica</i>		Gargano 11 m. - 1154	2		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1105,09	<i>Ostrea</i>	<i>adriatica</i>		(juv. 22 mm.) su Sphaeronassa mutabilis. 1114	2		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1106,00	<i>Ostrea</i>	<i>cochlear</i>	Poli	juv. su Litofilii. prof. 70 m. Porto Cesareo.	1	SI	<i>Neopyrenodonte cochlear</i> (Poli, 1795)
1106,02	<i>Ostrea</i>	<i>cochlear</i>	Poli	Croc. Bambù 500 m. (1 juv. v.) 28 giugno 1967	2		<i>Neopyrenodonte cochlear</i> (Poli, 1795)
1106,03	<i>Ostrea</i>	<i>cochlear</i>		RA 1969, St. 12, 160 m. (16 fr. juv. v. detr.) D. G. det.	2		<i>Neopyrenodonte cochlear</i> (Poli, 1795)
1106,04	<i>Ostrea</i>	<i>cochlear</i>		Mango 1967, St. 1, 1500 m. (4 juv. v. detr.) D. G. det.	2	SI	<i>Neopyrenodonte cochlear</i> (Poli, 1795)
1106,05	<i>Ostrea</i>	<i>cochlear</i>		Mango 1967, St. 2, 800 m. (3 detr.)	2	SI	<i>Neopyrenodonte cochlear</i> (Poli, 1795)
1106,14	<i>Pignodonta</i>	<i>cochlear</i>	(Poli)	juv. da 4 a 33 mm (su Briozoi, Porto Cesareo).	1		<i>Neopyrenodonte cochlear</i> (Poli, 1795)
1106,15	<i>Pignodonta</i>	<i>cochlear</i>	(Poli)	aggreg. di conch. - Porto Ces. 70 m. 1971	2		<i>Neopyrenodonte cochlear</i> (Poli, 1795)
1106,16	<i>Pignodonta</i>	<i>cochlear</i>		juv. su vecchia Murex br.; (detr.) Porto Cesareo profond. 70 m.	2	SI	<i>Neopyrenodonte cochlear</i> (Poli, 1795)
1107,00	<i>Ostrea</i>	<i>cristata</i>	Born	juv. (su Anomia) S. Vito (Taranto).	1		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1107,01	<i>Ostrea</i>	<i>cristata</i>	Born	Sedim. NE 1° s. Mar Piccolo (v. sup.)	1		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1108,00	<i>Ostrea</i>	<i>cyrnusi</i>		Sed. 1° s. Mar Piccolo di Taranto. (foss.)	1		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1109,00	<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>		562	1		<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)

1109,01	<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>	L.	Mare del Nord (Olanda) (cm. 13,5)	1	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1109,03	<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>		Bocche di Cattaro 1966 - Stjepovic leg.	1	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1109,06	<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>	<i>radiata</i>	Mare di Lesinaam Bebler leg. 1975. Numerosi juv., Settepassi det.	2	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1109,08	<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>		v. ader. a Pinna nobilis, Porto Cesareo m. 15	2	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1109,09	<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>	L.	(3 int.) Stagno di Thau (Francia) sett. 1968	2	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1109,11	<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>		Port de la Selva, Gerona. Altimira leg. 1975	2	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1109,12	<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>		Ampolla (Tarragona) Altimira leg. 1975	2	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1109,13	<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>		juv. 17 mm. - Cubellas - Barcellona - Altimira leg.	2	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1109,15	<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>		v. sup. juv. 1 mm - Rio Ribadeo- Spagna Atl. 1968, Panetta det.	1	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1111,00	<i>Ostrea</i>	sp.		juv. costa di Agrigento	1	<i>Ostreola stentina</i> (Payraudeau,1826)
1113,00	<i>Ostrea</i>	sp.		juv. su Sphaeronassa mutabilis - Versilia, Sesti leg.	1	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1114,00	<i>Ostrea</i>	(sp.)		su Murex trunculus - 562	2	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1115,00	<i>Ostrea</i>	(sp.)		picc. valve detrite - Vilasar de Mar, 20 km. da Barcellona, Altimira leg. 6/1975	2	<i>Ostreola stentina</i> (Payraudeau,1826)
1117,00	<i>Ostrea</i>	<i>stentina</i>	(Payr.) v. <i>pepranxi</i> B. D. D.	(6 v. detr.) sp. Cerano, Brindisi	1	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1117,01	<i>Ostrea</i>	<i>stentina</i>	(Payr.)	detr. Cattaro	1	<i>Ostreola stentina</i> (Payraudeau,1826)
1117,02	<i>Ostrea</i>	<i>stentina</i>		S. Vito (Taranto) dic. 1968.	1	<i>Ostreola stentina</i> (Payraudeau,1826)
1118,00	<i>Ostrea</i>	<i>stentina</i> ?		Valva anomala (due umboni) spiaggia di Cerano Brindisi Mazzetti leg. 1968.	1	<i>Ostreola stentina</i> (Payraudeau,1826)
1120,00	<i>Ostrea</i>	<i>taurica</i>	Kryn.	(detr.) Agigea, Mar Nero, costa romana, ott. 1969	1	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)
1120,01	<i>Ostrea</i>	<i>taurica</i>	Kryn.	(detr.) - Cap Midia, Mar Nero, ott. 1969.	1	<i>Ostrea edulis</i> (Linné,1758)

1120,02	<i>Ostrea</i>	<i>taurica</i>	Kry.	(46 v. detr. levig.; si not. varie forme e impressioni muscolari) Mar Nero, spiaggia di Mamata, ott. 1969.	1	<i>Ostrea edulis</i> (Linné, 1758)
1122,00	<i>Ostreola</i>	<i>parenzani</i>	Sett.	in schedis. OLOTIPO in Coll. Settepassi, Roma. Pubbl. con fot. Parenzani, Malaccol. Ionica (Thal. Ionica 1961, fig. 6; Parenzani, C. Id. Conc. Med. vol. 2° Biv. 1974)	1	<i>Ostreola parenzani</i> Settepassi, 1978
1123,01	<i>Ostreola</i>	<i>stentina</i>	(Payr.)	N Siracusa 1974 - Micali leg.	FC	<i>Ostreola stentina</i> (Payraudeau, 1826)
1125,00	<i>Ovatella</i>	<i>firmini</i>	(Payr.)	(6) Ven., Diga Alberoni - R. Guidastri leg, 1974.	1	<i>O. firmini</i>
1126,01	<i>Ovatella</i>	<i>myosotis</i>	(Drap.) f. <i>denticulata</i> Mtg.	"La Salina" ag. 1969.	1	<i>Ovatella (Myosotella) myosotis</i> (Draparnaud, 1801)
1126,02	<i>Ovatella</i>	<i>myosotis</i>	(Drap.) f. <i>denticulata</i> Mtg.	La Salina - 1972.	1	<i>Ovatella (Myosotella) myosotis</i> (Draparnaud, 1801)
1126,03	<i>Ovatella</i>	<i>myosotis</i>	(Drap.)	La Salina, loc. Torre Colimena, 1972.	1	<i>Ovatella (Myosotella) myosotis</i> (Draparnaud, 1801)
1126,05	<i>Ovatella</i>	<i>myosotis</i>	(Drap.)	(7 conch. compl. d'animale, fiss. disteso in alcool) La Salina 1975	2	<i>Ovatella (Myosotella) myosotis</i> (Draparnaud, 1801)
1126,06	<i>Ovatella</i>	<i>myosotis</i>	(Drap.)	Barena laguna veneta (una trentina) 1975	2	<i>Ovatella (Myosotella) myosotis</i> (Draparnaud, 1801)
1126,07	<i>Ovatella</i>	<i>myosotis</i>	(Drap.)	556	2	<i>Ovatella (Myosotella) myosotis</i> (Draparnaud, 1801)
1126,12	<i>Ovatella</i>	<i>myosotis</i>		La Salina Grande (5), 1983	3	<i>Ovatella (Myosotella) myosotis</i> (Draparnaud, 1801)
1127,00	<i>Ovatella</i>	(sp.)		(con animali) una decina, in alcool. Laguna Veneta 6/1975	2	<i>Ovatella (Myosotella) myosotis</i> (Draparnaud, 1801)
1131,00	<i>Oxygyrus</i>	<i>kerandreni</i>	(Les.)	Stadio embrionale, RA 7, Ionio, prep. D. G.	2	<i>Oxygyrus kerandrenii</i> (Lesueur, 1817)
1131,01	<i>Oxygyrus</i>	<i>kerandreni</i>	(Lesueur)	Ra 4, Ionio, preparato D. Ger.	2	<i>Oxygyrus kerandrenii</i> (Lesueur, 1817)
1140,22	<i>Palliolium</i>	<i>hyalinum</i>		juv. 6 mm (partic. col.) 710	1	<i>Lissopecten hyalinus</i> (Poli, 1795)?
1141,03	<i>Palliolium</i>	<i>incomparabilis</i>	Risso	(10 v. vario col.) 537	1	<i>P. incomparabile</i>
1159,06	<i>Patella</i>	<i>aspera</i>	Lam.	(detrita, rotta) La Strea, ag. 1984	3	<i>Patella cif-abyssiponensis</i> Gmelin, 1791
1182,00	<i>Pecten</i>	<i>magellanicus</i>	Gm.	Mazzara del Vallo - L. Giacobbe leg.	1	<i>P. magellanicus</i>

1202,00	<i>Pharus legumen</i>	<i>legumen</i>				1	Tor San Lorenzo (Tirreno) K. Angioy leg. 3/1970.	<i>Pharus legumen</i> (Linné,1767)
1202,01	<i>Pharus legumen</i>	<i>legumen</i>	L.			1	uguale a Ceratisolen legumen F. et H. Tirreno.	<i>Pharus legumen</i> (Linné,1767)
1202,02	<i>Pharus legumen</i>	<i>legumen</i>	(L.) v. <i>major</i> (B.D. D.)			1	Mare Cantabrico (Atl.)	<i>Pharus legumen</i> (Linné,1767)
1202,03	<i>Pharus legumen</i>	<i>legumen</i>	(L.)			1	Margherita di Savoia (Adriatico, Manfredonia)	<i>Pharus legumen</i> (Linné,1767)
1202,05	<i>Pharus legumen</i>	<i>legumen</i>				2	1101	<i>Pharus legumen</i> (Linné,1767)
1203,00	<i>Philine aperta</i>	<i>aperta</i>	L.			1	Catt. 8	<i>Philine aperta</i> (Linné,1767)
1203,01	<i>Philine aperta</i>	<i>aperta</i>				1	Catt. 45	<i>Philine aperta</i> (Linné,1767)
1203,02	<i>Philine aperta</i>	<i>aperta</i>				1	n/o "Nemima" Cattaro Ionio 557, 566	<i>Philine aperta</i> (Linné,1767)
1203,03	<i>Philine aperta</i>	<i>aperta</i>				1	561	<i>Philine aperta</i> (Linné,1767)
1203,04	<i>Philine aperta</i>	<i>aperta</i>	L.			2	(detr.) Mar Piccolo 1035	<i>Philine aperta</i> (Linné,1767)
1203,05	<i>Philine aperta</i>	<i>aperta</i>	L.			2	(coll'animale secco) Gargano 14 m. 1147	<i>Philine aperta</i> (Linné,1767)
1203,06	<i>Philine aperta</i>	<i>aperta</i>				2	Gargano 10 - 11 m. (5) 1162	<i>Philine aperta</i> (Linné,1767)
1203,07	<i>Philine sp.</i>	<i>sp.</i>				FC	381	<i>Philine aperta</i> (Linné,1767)
1204,00	<i>Philine scabra</i>	<i>scabra</i>				1	Catt. 36	<i>Philine scabra</i> (Linné,1767)
1204,01	<i>Philine scabra</i>	<i>scabra</i>	Mull.			1	Catt. 45	<i>Philine scabra</i> (Müller,1784)
1204,02	<i>Philine scabra</i>	<i>scabra</i>				1	Catt. 3	<i>Philine scabra</i> (Müller,1784)
1204,03	<i>Philine scabra</i>	<i>scabra</i>				1	Catt. 6, 9 (Baia di Risano)	<i>Philine scabra</i> (Müller,1784)
1204,04	<i>Philine scabra</i>	<i>scabra</i>	Lov.			1	"Nemima" Baia di Risano.	<i>Philine scabra</i> (Müller,1784)
1205,00	<i>Philippia pseudoperspectiva</i>	<i>pseudoperspectiva</i>				1	juv. Messina - Micali leg.	<i>Pseudotorinia architae</i> (Costa O.G.,1841)
1206,00	<i>Philippia loveni</i>	<i>loveni</i>	(Brocchi)			1	Palermo (detr.)	<i>Basisulcata lepida</i> (Bayer,1942)
1207,00	<i>Pholas dactylus</i>	<i>dactylus</i>	Jeffr.			2	Spaggia Laredo (Spagna atl.) (L. v. dett.)	<i>Perricola (Perricola) lithophaga</i> (Retzius,1786)
1208,00	<i>Pholas dactylus</i>	<i>dactylus</i>	L.			1	juv. 8 - 9 mm Golfo di Taranto	<i>Pholas dactylus</i> Linné,1758
1208,02	<i>Pholas dactylus</i>	<i>dactylus</i>				1	juv. 556	<i>Pholas dactylus</i> Linné,1758
1208,03	<i>Pholas dactylus</i>	<i>dactylus</i>	L.			2	(& v. dett.) Zapponeta (Adr.) 1975	<i>Pholas dactylus</i> Linné,1758
1208,04	<i>Pholas dactylus</i>	<i>dactylus</i>	L.			2	Ancona, Adr. - Giacosa leg. 1974 (con notizie)	<i>Pholas dactylus</i> Linné,1758
1208,05	<i>Pholas dactylus</i>	<i>dactylus</i>				2	(6 v. dett.) spiagge Cerano (Brindisi), Mazzetti leg. 1968	<i>Pholas dactylus</i> Linné,1758

1330,06	<i>Retusa</i>	<i>truncatula</i>	(Brug.)	Molfetta 1977 - (2) 1508	2	<i>Retusa truncatula</i> (Bruguère, 1792) + <i>Cyllichmina laevisculpta</i> (Gramata- Grillo, 1877)
1330,07	<i>Retusa</i>	<i>truncatula</i>	(Brug.)	Mar Piccolo di TA., 2° seno, 1981	3	<i>Retusa truncatula</i> (Bruguère, 1792)
1330,08	<i>Retusa</i>	<i>truncatula</i>	(Brus.)	La Strea, ag. 1984	3	<i>Retusa truncatula</i> (Bruguère, 1792)
1330,09	<i>Retusa</i>	<i>truncatula</i>	(Brug.)	Cala Violina (Follonica) Innocenti leg. 1977	FC	<i>Retusa truncatula</i> (Bruguère, 1792)
1331,01	<i>Retusa</i>	<i>umbilicata</i>	Mtg.	7, 1016	1	<i>Cyllichmina umbilicata</i> (Montagu, 1803) (2) + <i>Cyllichmina nitidula</i> (Loven, 1846) (5)
1331,02	<i>Retusa</i>	<i>umbilicata</i>	Mtg.	Molfetta 1977 (3) - 1508	2	<i>Weinkauffia turgidula</i> (Forbes, 1844)
1332,00	<i>Retusa</i>	<i>variabilis</i>	Mil.	Mar Nero e Azov - Carausi det. e don.	1	<i>Cyllichmina</i> sp.
1333,00	<i>Rhomboidella</i>	<i>portocesarea</i>	n. sp. (Par.)	OLOTIPO, f. corall. Porto Cesar. 1976	2	
1333,01	<i>Rhomboidella</i>	<i>portocesarea</i>	Par.	PARATIPO, f. corallig. Porto Cesareo 1976	2	
1334,00	<i>Rhopalomenia</i>	<i>carinata</i>	L.	v. Salvini - Plawen (n. sp.) (Solenog., in alcohol)	1	<i>R. carinata</i>
1335,00	<i>Ringicula</i>	<i>auriculata</i>	(Mén.)	134	1	<i>Ovatella firmi</i> juv
1335,01	<i>Ringicula</i>	<i>auriculata</i>	(Mén.)	Foss. Quatern. M.te Navone, Sicilia, Di Ger. leg	1	<i>Ringicula auriculata</i> (Ménard de la Groye, 1811)
1335,02	<i>Ringicula</i>	<i>auriculata</i>		(?) Fuengirola - Maldonado leg.	1	<i>Ringicula conformis</i> Monterosato, 1877
1337,00	<i>Ringicula</i>	<i>buccina</i>	(Brocchi)	Quaternario P.te Navone, Sicilia. Di Ger. leg.	1	<i>Ringicula</i> sp.
1338,00	<i>Ringicula</i>	<i>conformis</i>		Catt. 45	1	<i>R. conformis</i>
1338,01	<i>Ringicula</i>	<i>conformis</i>	Monts.	Catt. 3, 5, 8, 24	1	<i>Ringicula</i> cf. <i>auriculata</i> (Ménard de la Groye, 1811)
1338,02	<i>Ringicula</i>	<i>conformis</i>		Cattaro	1	<i>Ringicula auriculata</i> (Ménard de la Groye, 1811)
1338,03	<i>Ringicula</i>	<i>conformis</i>		n/o "Nemima" Cattaro (Baia di Risano)	1	<i>Ringicula conformis</i> Monterosato, 1877
1338,06	<i>Ringicula</i>	<i>conformis</i>	Monts.	(una trentina) Cattaro 3, 5, 8, 24,	2	<i>Ringicula conformis</i> Monterosato, 1877
1338,07	<i>Ringicula</i>	<i>conformis</i>		(4) Spiaggia S. Vito (Tar.) Fasani leg.	2	<i>Ringicula auriculata</i> (Ménard de la Groye, 1811)

1338,08	<i>Ringicula</i>	<i>conformis</i>		Cattaro - Gurdie - Muo - (8) 1976	2	<i>Ringicula conformis</i> Monterosato, 1877
1338,09	<i>Ringicula</i>	<i>conformis</i>	Monteros.	La Strea, ag. 1984	3	<i>Ringicula auriculata</i> (Ménard de la Groye, 1811)
1338,10	<i>Ringicula</i>	<i>conformis</i>		"Nemima" III	FC	<i>Ringicula auriculata</i> (Ménard de la Groye, 1811)
1339,00	<i>Ringicula</i>	<i>leptocheila</i>	Brugnone	Catt. 37	1	<i>Ringicula auriculata</i> (Ménard de la Groye, 1811)
1339,01	<i>Ringicula</i>	<i>leptocheila</i>	Brugnone	Quaternario, Sicilia, Di Ger. leg.	1	<i>Ringicula</i> cf. <i>leptocheila</i>
1340,00	<i>Ringicula</i>	sp.		398	1	<i>Ringicula auriculata</i> (Ménard de la Groye, 1811)
1341,00	<i>Ringicula</i>	<i>ventricosa</i>	Sow.	Citro S. Cataldo, Mar Grande - Set. det.	1	<i>Ringicula auriculata</i> (Ménard de la Groye, 1811)
1342,04	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		Costa Neretina	1	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,05	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>	(L.)	(19) Houmi - Souk (Is. Gerba, Tunisia) ott. 1974	1	<i>Rissoa paradoxa</i> (Monterosato, 1884)
1342,07	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>	L.	(det.) Lido Silvana, spiaggia	2	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,09	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		(2) Is. S. Pietro (costa merid.)	2	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,11	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		1315	2	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,14	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>	ssp. <i>paradoxa</i>	Golfo di Gabes (Tunisia) S. P. det.	3	<i>Rissoa paradoxa</i> (Monterosato, 1884)
1342,16	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		134	3	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,18	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		(4) - costa sett. insen. La Strea, dic. 1969, S. P. rev.	3	<i>Rissoa italiensis</i> Verduin, 1985
1342,19	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		(5) - Punta Negra (Alghero) 1969 - S. P. rev.	3	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,20	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		(2) - Granitola, Sic. occid. - Tuminello leg. S. P. rev.	3	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,21	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		Madonna D'Altomare - Giacosa leg. 1975	3	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,22	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		580	3	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,24	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		Brucoli (Augusta, Sicilia)	3	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,26	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		var. (dis. 247 C. d'Id. 1970), Mad. D'Altomare	3	<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)
1342,30	<i>Rissoa</i>	<i>auriscalpium</i>		Procida (NA), 3/5 m	FC	<i>Rissoa italiensis</i> Verduin, 1985
1343,03	<i>Rissoa</i>	<i>contorta</i>	Jeffr.	(1) Molfetta - 16 m - S. P. revis. 1508	3	<i>Aporrhais</i> cf. <i>pespelecanti</i> (Linné, 1758) juv

1344,03	<i>Turboella</i>	<i>cf. dolium</i>	Nyst.	Fondo a Cystoseira A. Vannelli legit STP det.	FC	<i>Pusillina philippi</i> (Aradas & Maggiore, 1844)
1350,03	<i>Rissoa</i>	<i>lineolata</i>	Mich.	(1) S. P. revis. 1032	3	<i>Pusillina cf. lineolata</i> (Michaud, 1832)
1351,04	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		(ca 300) 24 Pan. det.	2	<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)
1351,05	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		S. Pal. det. 45	3	<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)
1351,06	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		Mar Grande di Taranto. Revis. S. P. (prima erron.: <i>Rissoa oblonga!</i>)	3	<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)
1351,07	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		Mar Piccolo di Taranto - juv. S. P.	3	<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)
1351,08	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		Citro di S. Cataldo (M. Gr. Ta.) S. P. det.	3	<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)
1351,09	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		(9) - Lago Alimini (Adr.) 1958 - S. P. det.	3	<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)
1351,12	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		S. P. det. 556	3	<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)
1351,13	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		S. P. det. 1016	3	<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)
1351,14	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		(10) Ionio. Revis. S. P. (prima erron. <i>Rissoa venusta</i> .) Forma particolare (S. Palazzi)	3	<i>Rissoa monodonta</i> Philippi, 1836 (5) + <i>Pusillina cf. radiata</i> (Philippi, 1836) (2)
1351,15	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		Revis. S. Pal. (prima err.: <i>Rissoa</i> <i>guertini</i>)	3	<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)
1351,16	<i>Rissoa</i>	<i>membranacea</i>		S. P. revis. (prima erron.: R. subventricosa)	3	<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)
1352,00	<i>Rissoa</i>	<i>monodonta</i>	<i>f. auriformis</i> (Pall.)	(3) spiaggia Gabès, M. Taviani leg.	1	<i>Rissoa monodonta</i> Philippi, 1836
1352,01	<i>Rissoa</i>	<i>monodonta</i>		Catt. 8	1	<i>Rissoa monodonta</i> Philippi, 1836
1352,05	<i>Rissoa</i>	<i>monodonta</i>		Gargano (1) - 6 m - S. P. det. 1157	3	<i>Rissoa monodonta</i> Philippi, 1836
1352,06	<i>Rissoa</i>	<i>monodonta</i>		(10) - Cattaro 8 S. P. rev.	3	<i>Rissoa monodonta</i> Philippi, 1836
1352,07	<i>Rissoa</i>	<i>monodonta</i>		(9) S. P. det. 1016	3	<i>Rissoa monodonta</i> Philippi, 1836
1353,03	<i>Rissoa</i>	<i>nitida</i>	Brus.	Settepassi det. - Rev. S. P.: Hydrobidae sp.?	3	SI
1358,00	<i>Rissoa (Turboella)</i>	<i>semiplicata</i>	(Powell 1927)	Island Bay - Wellington - Nupva Zelandà, su alghe - S. Pal. don.	3	SI <i>R. semiplicata</i> (Powell, 1927)

1359,00	<i>Rissoa</i>	<i>similis</i>	Scacchi	(vedi <i>Turboella similis</i>) Sicilia occ., Tumm. I. Granitola - esemplare caratteristico disegnato	2	<i>Rissoa guerinii</i> Recluz, 1843
1359,01	<i>Rissoa</i>	<i>similis</i>		Granitola, Sicilia occ. - Tumm. leg. 1975	2	<i>Rissoa similis</i> Scacchi, 1836
1359,02	<i>Rissoa</i>	<i>similis</i>	subcostulata	Algesirae, spiaggiata. St. Palazzi don.	3	<i>Rissoa guerinii</i> Recluz, 1843
1359,05	<i>Rissoa</i>	<i>similis</i>		(Apicularia) S. P. det.	3	<i>Rissoa similis</i> Scacchi, 1836
1359,07	<i>Rissoa</i>	<i>similis</i>		juv. Costa Nereina - Revis. S. P. (prima erronea: violacea) D'Angelo leg.	3	<i>Rissoa guerinii</i> Recluz, 1843
1364,00	<i>Rissoa</i>	sp.		La Strea, ag. 1984	3	<i>Rissoa ventricosa</i> Desmarest, 1814
1367,02	<i>Rissoa</i>	<i>splendida</i>		juv., su Cistoseira (80) - Cattaro - S. P. rev.	3	<i>Rissoa splendida</i> Eichwald, 1830
1367,03	<i>Rissoa</i>	<i>splendida</i>		Cattaro - fondo a Cladocora - S. P. det.	3	<i>Rissoa splendida</i> Eichwald, 1830
1367,04	<i>Rissoa</i>	<i>splendida</i>	Eich.	Cattaro 15 - 16 (100)	3	<i>Rissoa splendida</i> Eichwald, 1830
1367,05	<i>Rissoa</i>	<i>splendida</i>		(3) Cattaro 24 - S. P. det.	3	<i>Rissoa splendida</i> Eichwald, 1830
1367,06	<i>Rissoa</i>	<i>splendida</i>		S. P. det. 1016	3	<i>Rissoa splendida</i> Eichwald, 1830
1367,07	<i>Rissoa</i>	<i>splendida</i>		Cattaro 25 S. P. det.	3	<i>Rissoa splendida</i> Eichwald, 1830
1367,08	<i>Rissoa</i>	<i>splendida</i>		45	3	<i>Rissoa splendida</i> Eichwald, 1830
1370,02	<i>Rissoa</i>	<i>variabilis</i>	(Mull)	(7, Mull.) Brindisi - Adriatico	1	<i>Rissoa variabilis</i> (Von Muehlefeldt, 1824)
1370,03	<i>Rissoa</i>	<i>variabilis</i>	Mgle.	5, 1016	1	<i>Rissoa variabilis</i> (Von Muehlefeldt, 1824)
1370,04	<i>Rissoa</i>	<i>variabilis</i>	Mühlf. <i>brevis</i> Monts.	Fondo a Cistoseira (14) Porto Cesareo	3	<i>Rissoa variabilis</i> (Von Muehlefeldt, 1824)
1370,05	<i>Rissoa</i>	<i>variabilis</i>	ssp. <i>spongicola</i>	(4) - Golfo di Gabes - 0,5 m. S. P. det.	3	<i>Rissoa variabilis</i> (Von Muehlefeldt, 1824)
1370,07	<i>Rissoa</i>	<i>variabilis</i>		(2) - S. P. det. 504	3	<i>Rissoa variabilis</i> (Von Muehlefeldt, 1824)
1370,08	<i>Rissoa</i>	<i>variabilis</i>		(156) S. P. det. 193	3	<i>Rissoa variabilis</i> (Von Muehlefeldt, 1824)
1370,09	<i>Rissoa</i>	<i>variabilis</i>		(1) - Sic. occ. Tuminello leg. S. P. det.	3	<i>Rissoa variabilis</i> (Von Muehlefeldt, 1824)

1370,10	<i>Rissoa</i>	<i>variabilis</i>		S. P. det. 580	3	SI	<i>Rissoa variabilis</i> (Von Muehlefeldt, 1824)
1371,02	<i>Rissoa</i>	<i>ventricosa</i>	Desm.	556	1	SI	<i>Rissoa ventricosa</i> Desmarest, 1814
1371,08	<i>Rissoa</i>	<i>ventricosa</i>		S. P. det. - 580	3		<i>Rissoa ventricosa</i> Desmarest, 1814
1371,09	<i>Rissoa</i>	<i>ventricosa</i>		(20) S. P. det. 1016	3		<i>Rissoa ventricosa</i> Desmarest, 1814
1373,02	<i>Rissoa</i>	<i>violacea</i>	Desm.	(1) - S. P. revis. - 585, 586	3	SI	<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
1373,03	<i>Rissoa</i>	<i>violacea</i>		S. P. det. 1016	3		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
1373,04	<i>Rissoa</i>	<i>violacea</i>		S. P. det. 193	FC		<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843
1376,00	<i>Rissoina</i>	<i>bertholletii</i>		Israele, Haifa - Barash leg.	1	SI	<i>Rissoina (Rissoina) bertholletii</i> Issel, 1869
1376,01	<i>Rissoina</i>	<i>bertholletii</i>	Issel	Israele, leg. Haas et Mienis, Mienis don.(16)	2		<i>Rissoina (Rissoina) bertholletii</i> Issel, 1869
1377,01	<i>Rissoina</i>	<i>brugueri</i>		Golfo di Gabes - Tumm. leg.	2		<i>Rissoina (Rissoina) brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
1377,02	<i>Rissoina</i>	<i>brugueri</i>		Sicilia occid., Tumm. leg. 1975	2		<i>Rissoina (Rissoina) brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
1377,03	<i>Rissoina</i>	<i>brugueri</i>		(14) S. P. det. 193	3		<i>Rissoina (Rissoina) brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
1377,04	<i>Rissoina</i>	<i>brugueri</i>		Str. Messina, Micali leg.	1		<i>Rissoina (Rissoina) brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
1377,05	<i>Rissoina</i>	<i>brugueri</i>	(Payr.)	96, 134, 193, 132	1		<i>Rissoina (Rissoina) brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
1377,07	<i>Rissoina</i>	<i>brugueri</i>		1016	1		<i>Rissoina (Rissoina) brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
1377,08	<i>Rissoina</i>	<i>brugueri</i>		580	1		<i>Rissoina (Rissoina) brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
1377,11	<i>Rissoina</i>	<i>brugueri</i>		spiaggia Madonna D'Altomare	1		<i>Rissoina (Rissoina) brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
1377,13	<i>Rissoina</i>	<i>brugueri</i>	(Payr.)	236	1		<i>Rissoina (Rissoina) brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
1377,14	<i>Rissoina</i>	<i>brugueri</i>		juv. Brindisi	FC		<i>Rissoina (Rissoina) brugueri</i> (Payraudeau, 1826)
1389,00	<i>Saccanella</i>	<i>plicata</i>	(Mtg.)	588	1	SI	<i>Thracia distorta</i>
1390,05	<i>Scala</i>	<i>pulchella</i>	(Biv.)	(detr. rotto) - Vendicari (Sicilia or.) Tumm. leg.	2	SI	<i>Epitonium pulchellum</i> (Bivona Ant., 1832)
1391,01	<i>Scaphander</i>	<i>lignarius</i>	(L.)	Alghero, Sardegna	1		<i>Scaphander lignarius</i> (Linné, 1758)

1398,01	<i>Serobicularia</i>	<i>cottardi</i>		Porto Cesareo	1	<i>Serobicularia cottardi</i> (Payraudeau, 1826)
1398,02	<i>Serobicularia</i>	<i>cottardi</i>		217, 220	1	<i>Serobicularia cottardi</i> (Payraudeau, 1826)
1398,03	<i>Serobicularia</i>	<i>cottardi</i>	(Payr.)	La Strea - Porto Cesareo	1	<i>Serobicularia cottardi</i> (Payraudeau, 1826)
1398,05	<i>Serobicularia</i>	<i>cottardi</i>		(58 v. spiagg. Porto Cesareo La Strea)	1	<i>Serobicularia cottardi</i> (Payraudeau, 1826)
1398,07	<i>Serobicularia</i>	<i>cottardi</i>		(14 int.) Porto Cesareo, prof. 20 - 60 cm.	1	<i>Serobicularia cottardi</i> (Payraudeau, 1826)
1399,00	<i>Serobicularia</i>	<i>plana</i>	(Da Costa)	Cattaro	1	<i>Serobicularia plana</i> (Da Costa, 1778)
1404,00	<i>Seila</i>	<i>trilineata</i>	(Phil.)	Sicilia, Santo Grasso det., don.	3	<i>Seila trilineata</i> (Philippi, 1836)
1415,00	<i>Siphonium</i>	<i>affrum</i>	(Gmel.)	La Strea - Porto Cesareo	1	<i>Ivermetus granulatus</i>
1416,00	<i>Skenea</i>	<i>laevis</i>	Phil.	Talamone (Orbetello) Micali leg.	1	<i>S. serpuloides</i>
1418,00	<i>Skenea</i>	<i>serpuloides</i>	Mtg.	Bocche di Bonifacio 100 - 150 m. Carr. don.	2	<i>S. serpuloides</i>
1420,00	<i>Skeneopsidae</i>	sp.?		cca 0, 8 mm. (o f. juv. di Caecum ?) 409	2	<i>Limacina inflata</i>
1421,02	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>	<i>lineata</i> Mts.	601	1	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1421,03	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>	v. <i>matonia</i> Risso	citro di S. Cataldo, Mar Grande	1	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1421,05	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>	L.	1016	1	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1421,10	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>		(3 var.) spiaggia, Mad. D'Altomare.	1	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1421,11	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>		(4 es., var. col. e f.) sp. Mad. D'Altomare.	1	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1421,12	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>		costa di Agrigento (Sicilia)	1	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1421,13	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>		7 sp. Mad. D'Altomare.	1	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1421,14	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>	L.	14 Monopoli (Adr.) 1968 - Giacosa leg. 1974.	1	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1421,20	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>		(3) - Costa merid. Isola S. Pietro (Cheradi)	2	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1421,26	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>		Lido Acquadolce, Manuggio, M. Filippi leg. 1982	3	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1421,27	<i>Smaragdia</i>	<i>viridis</i>		Spiaggia Torre Ovo (9) dic. 72	FC	<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)
1423,00	<i>Solecurtus</i>	<i>candidus</i>	Remieri	Bocche di Cattaro	1	<i>S. scopula</i>
1423,01	<i>Solecurtus</i>	<i>candidus</i>	(Remieri)	523	1	<i>S. scopula</i>

1423,02	<i>Solecurtus</i>	<i>candidus</i>	Fuengirola (Malaga)? Mald. Quil. leg.	1	<i>S. scopula</i>
1424,00	<i>Solecurtus</i>	<i>strigillatus</i>	Versilia Sesti leg.	1	<i>Solecurtus strigillatus</i> (Linné,1767)
1425,01	<i>Solenomya</i>	<i>togata</i>	Golfo di Taranto	1	SI <i>Solenomya togata</i> (Poli,1795)
1426,00	<i>Solen</i>	<i>marginatus</i>	Vilanova, Barcellona	1	<i>Solen marginatus</i> Pulteney,1799
1426,12	<i>Solen</i>	<i>marginatus</i>	Jesolo 8 m	2	<i>Solen marginatus</i> Pulteney,1799
1436,13	<i>Spisula</i>	<i>triangula</i>	La Strea, ag. 1984	3	SI <i>Spisula subtruncatula</i> (Da Costa,1778)
1442,09	<i>Strialca</i>	<i>lactea</i>	1016	1	SI <i>S. lactea</i>
1443,00	<i>Strigatella</i>	<i>virgata</i>	(uguale a <i>S. zebra</i> Lam.) (Indo - Pacifico), Mezzetti leg. spiaggia Brindisi, e confermato la loc.(?), Set. d.	1	SI <i>S. virgata</i> (Reeve,1844)
1462,00	<i>Tectonatica</i>	<i>flammulata</i>	Actrezza m 80	1	SI <i>T. flammulata</i> (2) + <i>Euspira macilenta</i> (1)
1466,01	<i>Moerella</i>	<i>donacina</i>	93, 304	1	<i>Tellina (Tellinella) distorta</i> Poli,1791
1466,06	<i>Moerella</i>	<i>donacina</i>	Torre di Rivoli (Foggia), Martucci leg 1975	2	<i>Tellina (Tellinella) distorta</i> Poli,1791
1473,00	<i>Tellinella</i>	sp.	juv. La Strea, ag. 1984	3	SI <i>Tellina (Tellinella) putchella</i> Lamareck,1818
1490,00	<i>Theodoxus</i>	<i>jordani</i>	Lago Tiberiade (43) apr. 1977 - Parenzan leg.	2	SI <i>T. jordani</i>
1490,04	<i>Theodoxus</i>	<i>jordani</i>	Fiume Giordano (Israele)	3	<i>T. jordani</i>
1493,00	<i>Thracia</i>	n/o	"Nemima" Baia di Risano (Bocche di Cattaro)	1	<i>Thracia (Thracia) pubescens</i> (Pulteney,1799)
1494,12	<i>Thracia</i>	<i>papyrifera</i>	Gargano 1141	2	SI
1501,00	<i>Thyasira</i>	<i>orahovaziana</i>	Orahovac (B. di Cattaro) OLOTIPO	1	SI
1509,05	<i>Tornus</i>	<i>subcarinatus</i>	detrito - Sp. Marini 20/7/1981	3	SI <i>Tornus subcarinatus</i> (Montagu,1803)
1511,00	<i>Trachysma</i>	<i>exquisitum</i>	Dr. Carr. leg. - Bocche di Bonfaiato 1975	2	SI <i>Dikoleps mariannae</i>
1513,37	<i>Tricola</i>	<i>pulla</i>	detr. S. Vito (Taranto) apr. 1973	2	SI <i>Tricola pullus pullus</i> (Linné,1758) + (3) <i>T. speciosa</i> (Von Muehlfeldt,1824)
1513,53	<i>Tricola</i>	<i>pulla</i>	La Strea, ag. 1984	3	<i>Tricola tenuis</i> (Michaud,1829)
1531,03	<i>Triton</i>	<i>corrugatus</i>	Fondo a Peyss. polym. 70 m - Porto Cesareo	FC	
1554,16	<i>Truncatella</i>	<i>subcylindrica</i>	Spaggià Marini, 20/7/1982	3	<i>Truncatella subcylindrica</i> (Linné,1767)

1557,02	<i>Tubiola</i>	<i>affinis</i>	Mts.	FC	<i>Dikoleps marianae</i>
1566,10	<i>Turbonilla</i>	<i>delicata</i>	La Strea, ag. 1984	3	<i>Turbonilla sinuosa</i> (Jeffreys, 1884)
1580,16	<i>Turritella</i>	<i>triplicata</i>	Juv. punta rigenerata, 1788	FC	<i>T. communis</i>
1582,01	<i>Tyrodina</i>	<i>citrina</i>	(30) con perostraco - Porto Cesareo, Di Nisio leg. 1980	3	<i>Tyrodina perversa</i> (Gmelin, 1791)
1583,00	<i>Typhinellus</i>	<i>sowerbyi</i>	Capo Passero, Santo Grasso leg. 377	3	<i>Typhinellus sowerbyi</i> (Broderip, 1833)
1601,01	<i>Volva</i>	<i>acuminata</i>		2	<i>Volvutella acuminata</i>
1608,04	<i>Xylophaga</i>	<i>dorsalis</i>	(2 int., 35 v.) Di Nisio leg. 1980	3	<i>X. dorsalis</i>
1613,00	<i>Cancellaria</i>	<i>similis</i>	Majorca, 1979	FC	<i>C. similis</i>
1614,00	<i>Melanella</i>	<i>santandreae</i>	n. sp.	FC	[sembra un indiv. Juv. di <i>Truncatella subcylindrica</i>]
1615,00	<i>Cuspidaria</i>	<i>salentina</i>	Mare di Castramarina (Jonio or.) prof. 55m Parenzan leg. et det., olotipo 1783	FC	Forse è la specie descritta da Di Geronimo col nome di <i>C. elliptica</i> Di Geronimo, 1974
1616,00	<i>Pustostoma</i>	<i>mendicaria</i>	1 Mar Rosso? Paolo Parenzan don 1950	FC	Buccinidae tropicale indet.
1617,00	<i>Ditropa</i>	<i>cornea</i>	Catt.	FC	
1617,01	<i>Ditropa</i>	<i>cornea</i>	Catt.	FC	
1618,00	<i>Argyrotheca</i>	<i>cuneata</i>	Fondo a Peyssonnelia - 70 m rosa marina Porto Cesareo	FC	
1618,01	<i>Argyrotheca</i>	<i>cuneata</i>	Fondo a Peyssonnelia - 70 m Porto Cesareo	FC	
1619,00	<i>Argyrotheca</i>	<i>neapolitana</i>	509 - 50 m Tricase	FC	
1620,00	<i>Megathyris</i>	<i>detruncata</i>	509 - 50 m	FC	
1621,00	<i>Kleinella</i>	<i>bulinea</i>	22.8.75 m 30-40, STP det., Simunović leg.	FC	<i>Euparthenia bulinea</i> (Lowe, 1841)
1626,00	<i>Lithothamnion</i>	<i>philippii</i>	1812	FC	
1627,00	<i>Lithothamnion</i>	<i>racemus</i>	1812	FC	
1634,00	<i>Peplum</i>	<i>inflatum</i>	RA 1969, St. 12, 160 m (12 v., 7 fr.) Di Ger. det.	FC	
1755,00	<i>Cyrtara</i>	sp.	Costa Follonica, Piombino L. Innocenti legit 1977	FC	<i>M. unifasciata</i>

