


PUTILLA MONOPOLITANA n. sp., GASTEROPODO
(FAM. RISSOIDAE) NUOVO PER LA FAUNA PUGLIESE

Nel saggio n. 1314 (febr. 1977, profondità 40 m), trovai due esemplari di una *Putilla* di circa 1 mm, che, messa a confronto con le specie note per i mari europei, non trovò corrispondenza per alcune caratteristiche ben distinte: tre sole spire, l'apicale piatta e depressa per cui la conchiglia appare superiormente tronca. La spira maggiore, a botticella, si apre con una bocca a goccia, alta poco più della metà della spira stessa. Superficie liscia; a forte ingrandimento rivela un fre-gio spirale, come un'esile banda finissimamente e obliquamente striata. Nessuna traccia di ombelico. La bocca presenta



Putilla monopolitana n. sp.

il lato columellare semplice, lievissimamente sinuoso; labbro esterno sottile; la fauce lascia vedere, a forte ingrandimento, lievissime striolature sia assiali che spirali, da formare un finissimo reticolo vitreo, visibile solo attraverso la luce del microscopio. Questa particolare forma, che, a titolo provvisorio (in attesa di trovare altri esemplari) indico col nome di *Pu-tilia monopolitana*, è stata raccolta a 40 m di profondità nel mare di Monopoli (costa pugliese adriatica a sud di Bari, su fondale di fango ricco di detrito vegetale. Uno degli esemplari, molto delicati, è andato distrutto nel corso dell'esame; uno è stato conservato (olotipo) e fa parte della collezione della Stazione di Biologia Marina di Porto Cesareo.

DIAGNOSI:

Conchiglia delicatissima, quasi trasparente, alta circa 1,1, mm. Tre spire: la prima molto bassa, piatta e depressa, la terza grande, a botticella. Superficie liscia, con uno o due fregi spirali. Assenza di ombellico. Fauce grande, a goccia, labbro esterno sottile.

Raccolta nel mare di Monopoli (Puglia, Adriatico) su fango alla profondità di 40 metri.

Olotipo nella Collezione della Stazione di Biologia Marina di Porto Cesareo.

Testa fragilissima, fere perlucida, alta mm. 1,1.
Tres spirae: una demissa, plana et depressa, tertia magna et forma dolioli. Superficies levis, cum uno vel duobus ornamentis in spiram convolutis. Umbilicus absens. Fauces magnae, quibus guttae forma est; labrum externum tenue.

Collecta in Monopolense mari (Puglia, Adriatico) e limo profundo 40 m.

HOLOTYPUS in collectione Stationis Biologiae Marinae in Porto Cesareo.